INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
Forticillin ad us. vet., iniettore con unguento per uso intramammario per mucche.

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Biokema SA, Ch, de la Chatanérie 2, 1023 Crissier.

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Forticillin ad us. vet., iniettore con unguento per uso intramammario per mucche.

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 iniettore da 10 g di unguento contiene:

Principi attivi:

Benzilpenicillina procaina	1 milione di U.I.
Benzilpenicillina potassica	1 milione di U.I.
Neomicina (come neomicina solfato)	525 mg

Eccipienti:

Sodio deidroacetato	10 mg

Unguento di colore biancastro-giallo in dispositivi per iniezione per uso intramammario.

4. INDICAZIONE(I)

Prevenzione e trattamento di infezioni mammarie durante la messa in asciutta della mucca.

5. CONTROINDICAZIONI

Non usare in animali nel periodo della lattazione.
Non usare in casi di nota ipersensibilità a un principio attivo o a un eccipiente.

6. EFFETTI COLLATERALI

Reazioni allergiche (gravi reazioni di shock pericolose per la vita, reazioni cutanee allergiche).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Mucche.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per ogni quarto, somministrare l'intero contenuto di un iniettore. Dopo il trattamento, astenersi dal mungere l'animale.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Mungere bene la mammella.
Pulire accuratamente il capezzolo con la salvietta disinfettante.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Se il periodo di messa in asciutta dura meno di 6 settimane, prima della consegna del latte occorre esaminarlo per controllare l'assenza di inibitori. Se l'animale viene macellato durante il periodo di messa in asciutta, il tessuto edibile deve essere esaminato per la presenza di inibitori.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).
Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: Il medicamento veterinario deve essere usato preferibilmente solo l'esecuzione di un test di sensibilità da parte del veterinario.
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali: Le persone con nota ipersensibilità alla benzilpenicillina devono evitare il contatto con il medicamento veterinario.
Evitare il contatto diretto con la cute o le mucose della persona che somministra il medicamento veterinario a causa del rischio di sensibilizzazione e in caso di ipersensibilità già nota a uno dei componenti. In caso di contatto con la pelle e le mucose, lavare via il prodotto sotto l'acqua corrente.
Allattamento: Questo preparato non deve essere somministrato durante l'allattamento.
Interazione con altri medicamenti e altre forme d'interazione: Le penicilline non devono essere co-somministrate con altri antibiotici (batteriostatici), poiché sono attive solo contro batteri in crescita.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti): Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.
Incompatibilità: Non sono note incompatibilità fisico-chimiche.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicamenti non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.
Chiedere alla/al propria/a veterinaria/ veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicamenti di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

06.12.2023
Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Scatola con 4 iniettori in HDPE da 10 g e 4 salviette disinfettanti (con benzetonio cloruro e alcol isopropilico).
Scatola con 100 iniettori in HDPE da 10 g e 100 salviette disinfettanti (con benzetonio cloruro e alcol isopropilico).
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria.
Swissmedic 42004.
Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.