

INFORMATION FÜR TIERHALTERINNEN UND TIERHALTER

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.swissmedicinfo-pro.ch

PACKUNGSBEILAGE

Chloropal mite / forte ad us. vet., orale Suspension für Hunde, Katzen und kleine Nager

1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSHABERIN

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Chloropal mite / forte ad us. vet., orale Suspension für Hunde, Katzen und kleine Nager

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml Suspension enthält:	<u>Chloropal mite</u>	<u>Chloropal forte</u>
--------------------------	-----------------------	------------------------

Wirkstoff:

Chloramphenicol (als Chloramphenicol-palmitat)	25 mg	100 mg
--	-------	--------

Sonstiger Bestandteil:

Natriumbenzoat (E211)	5.0 mg	5.0 mg
-----------------------	--------	--------

Suspension zum Eingeben

Mite: weisse Suspension

Forte: weisse, dickflüssige Suspension

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Antibiotikum für Hunde, Katzen und kleine Nager

Behandlung und Vorbeugung von Infektionskrankheiten bei Hunden, Katzen und kleinen Nagern, verursacht durch Chloramphenicol-empfindliche Erreger

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei Störungen der Blutbildung, schweren Leber- und Nierenschäden.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil.

6. NEBENWIRKUNGEN

Chloropal mite / forte wird allgemein gutvertragen. Gelegentlich können Fressunlust, Erbrechen und Durchfall auftreten. Nach Verabreichung hoher Dosen oder nach Verabreichung über längeren Zeitraum kann es vor allem bei Katzen zu einer Störung der Blutbildung kommen.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Hund, Katze und kleiner Nager



8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Richtdosierung: 30 – 50 mg/kg KGW täglich peroral

1 ml Chloropal mite / forte enthält 25 mg bzw. 100 mg Chloramphenicol.

Chloropal mite

Für 1 kg KGW = 1.2 – 2 ml

Für 2 kg KGW = 2.4 – 4 ml

Für 5 kg KGW = 6 – 10 ml

Für 10 kg KGW = 12 – 20 ml

Chloropal forte

Für 4 kg KGW = 1.2 – 2 ml

Für 10 kg KGW = 3 – 5 ml

Für 20 kg KGW = 6 – 10 ml

Für 40 kg KGW = 12 – 20 ml

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Vor Gebrauch schütteln. Die empfohlene Tagesdosis soll auf zwei bis drei Einzeldosen verteilt werden, um ein Absinken der Blutkonzentration zu verhindern. Verabreichung der Einzeldosis vor den Mahlzeiten. Abmessen mit beiliegender Kunststoffspritze.

Der geschmacksneutrale Wirkstoff führt zusammen mit der Aromatisierung zu einer guten Akzeptanz bei den Zieltierarten.

10. WARTEZEIT(EN)

Nicht bei Tieren anwenden, die für die Gewinnung von Lebensmitteln vorgesehen sind.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bei Raumtemperatur lagern (15°C – 25°C).

Das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton mit «EXP.» angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Trächtigkeit und Laktation:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und der Laktation ist nicht belegt. Nur anwenden nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung durch die behandelnde Tierärztin / den behandelnden Tierarzt..

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Chloramphenicol verlängert die Wirkdauer und/oder steigert die Toxizität von gewissen anderen Wirkstoffen.

Chloropal mite / forte darf nur gemäss tierärztlicher Anweisung angewendet werden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):



Eine orale Chloramphenicol Überdosierung kann Magen-Darmstörungen und/oder zuschwerer Knochenmarksschädigung führen.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihre Tierärztin / Ihren Tierarzt oder Ihre Apothekerin / Ihren Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

18.08.2020

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.swissmedicinfo-pro.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Kunststoff-Flasche mit 10 oder 50 ml Inhalt mit Kunststoffspritze (5 ml) in Faltschachtel

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 49413

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der in der Rubrik 1 genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.

