

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Drontal flavour Plus ad us. vet., comprimés pour chiens

Drontal flavour Plus XL ad us. vet., comprimés pour chiens

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

1 comprimé contient:

Substances actives:

	Drontal flavour Plus	Drontal flavour Plus XL
Praziquantel	50 mg	175 mg
Pyrantel (sf d'embonate)	50 mg	175 mg
Fébantel	150 mg	525 mg

Excipients:

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pour administration orale.

Comprimé brun clair à brun, ovale, sécable, à diviser en deux avec une ligne de sécabilité sur les deux faces.

4. INFORMATIONS CLINIQUES

4.1 Espèces cibles

Chien

4.2 Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

Chez les chiens, traitement des nématodes et des cestodes suivants

Ascaris *Toxocara canis*

Toxascaris leonina

Ankylostomes *Uncinaria stenocephala*

Ancylostoma caninum

Trichures *Trichuris vulpis*

Cestodes *Echinococcus granulosus*

Echinococcus multilocularis

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Multiceps multiceps

Mesocestoides spp.

4.3 Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à un principe actif ou à un autre composant.

4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Les puces servent d'hôtes intermédiaires pour l'un des vers plats les plus communs: *Dipylidium caninum*. L'infestation par les vers plats peut réapparaître à moins que des mesures de contrôle contre les hôtes intermédiaires (comme les puces, les souris, etc.) ne soient entreprises.

4.5 Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez l'animal

L'usage fréquent et répété d'un anthelminthique d'une même classe peut conduire au développement de résistance aux anthelminthiques de cette classe.

Comme le médicament vétérinaire est aromatisé, il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent et les ingèrent de manière excessive. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Le médicament vétérinaire contient du praziquantel et est efficace contre *Echinococcus* spp.

L'échinococcose constitue un danger pour l'homme. L'échinococcose étant une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), des directives particulières des autorités compétentes doivent être respectées en ce qui concerne le traitement, les contrôles ultérieurs nécessaires et la protection des personnes.

4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité)

Dans de très rares cas (moins d'1 animal sur 10'000 animaux traités), des troubles digestifs bénins et transitoires tels que vomissements et/ ou diarrhée peuvent survenir. Dans des cas individuels ces effets peuvent s'accompagner de signes non spécifiques telle que de la léthargie, de l'anorexie et de l'hyperactivité.

4.7 Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte

L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation et de lactation.

L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie pendant le premier et le deuxième tiers de la gestation. Chez les chiennes, l'utilisation pendant les deux premiers tiers de la gestation ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire responsable.

4.8 Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Aucune connue.

4.9 Posologie et voie d'administration

Drontal flavour Plus:

Sauf prescription contraire, on administre 1 comprimé par 10 kg de poids corporel pour une vermifugation complète. Malgré la rainure en croix, les comprimés ne peuvent être divisés qu'en demi-comprimés et ne doivent pas être divisés en ¼ de comprimé.

Drontal flavour Plus XL:

Administer 1 comprimé par 35 kg de poids corporel.

Mode d'administration

Les comprimés sont administrés directement à l'animal. Le mieux est de les cacher dans un morceau de viande, de saucisse ou de fromage. Des mesures diététiques ne sont pas nécessaires pour les chiens adultes ni pour les chiots.

Durée du traitement

La préparation est administrée en une seule fois. En cas d'infestation de vers diagnostiquée, il faut toujours procéder à une vermifugation immédiate avec un nouveau traitement après 2 semaines.

4.10 Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles devront faire l'objet d'un traitement symptomatique.

4.11 Temps d'attente

Sans objet.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Groupe pharmacothérapeutique: Anthelminthique à large spectre; Praziquantel, combinaisons

Code ATCvet: QP52AA51

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Drontal® flavour Plus est un anthelminthique contre les nématodes et les cestodes contenant comme substances actives un dérivé de la tétrahydropyrimidine: le pyrantel (sf sel de pamoate), un dérivé pro-benzimidazole: le fébantel, et un dérivé de la pyrazinoisoquinoléine: le praziquantel.

Le spectre d'action du praziquantel comprend toutes les principales espèces de cestodes présentes chez le chien. Il comprend en particulier toutes les espèces de taenia, *Multiceps multiceps*, *Dipylidium caninum*, *Mesocostoides spp.*, *Echinococcus granulosus* et *Echinococcus multilocularis*.

Le praziquantel agit contre tous les stades intestinaux de ces parasites présents chez le chien et le chat.

Dans la combinaison de substances actives présente dans la préparation, le l'embonate de pyrantel

et le fébantel présentent un effet synergique chez les chiots et les jeunes chiens contre toutes les espèces de vers ronds testées (ascaris, ankylostomes et trichures).

Le spectre d'action comprend en particulier *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* et *Trichuris vulpis*.

5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques

Pas de données disponibles

5.3 Propriétés environnementales

Pas de données disponibles

6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Amidon de maïs

Lactose monohydraté

Cellulose microcristalline

Stéarate de magnésium

Laurilsulfate de sodium

Silice colloïdale anhydre

Povidone

Arôme de viande

6.2 Incompatibilités majeures

Sans objet.

6.3 Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente: 36 mois

La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date de péremption figurant après la mention «Verwendbar bis» sur le blister.

Les demi-comprimés non utilisés ne doivent pas être conservés.

6.4 Précautions particulières de conservation

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

6.5 Nature et composition du conditionnement primaire

Blister en feuilles d'aluminium revêtues

Drontal flavour Plus:

Boîte de 12 blisters de 10 comprimés

Drontal flavour Plus XL:

Boîte de 12 blisters de 2 comprimés

6.6 Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Vetoquinol AG

Freiburgstrasse 255

3018 Berne

Téléphone: 031 818 56 56

Email: info.switzerland@vetoquinol.com

8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Swissmedic 49'615 051 120 comprimés

Swissmedic 49'615 053 24 comprimés

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

Date de première autorisation: 15.12.1988

Date du dernier renouvellement: 10.06.2022

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

25.03.2025

INTERDICTION DE VENTE, DÉLIVRANCE ET/OU D'UTILISATION

Sans objet.