

INFORMATION FÜR TIERHALTERINNEN UND TIERHALTER

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.swissmedicinfo-pro.ch

PACKUNGSBEILAGE

VETISEPT ad us. vet., Lösung 10 %, Spray und Salbe für Tiere

VETISEPT ad us. vet., Uterus-Tabletten für Rinder

1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Vetisept ad us. vet., Lösung 10 % für Tiere

Vetisept ad us. vet., Spray für Tiere

Vetisept ad us. vet., Salbe für Tiere

Vetisept ad us. vet., Uterus-Tabletten für Rinder

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wirkstoff:

Lösung 10 %: Iod 10 mg/ml (als Polyvidon-Iod)

Spray: Iod 5 mg/ml (als Polyvidon-Iod)

Salbe: Iod 10 mg/g (als Polyvidon-Iod)

Uterus-Tabletten: Iod 100 mg pro Tablette (als Polyvidon-Iod)

Sonstige Bestandteile:

Lösung 10 %: Glycerol, Nonoxinol 9, Dinatriumhydrogenphosphat dihydrat, Citronensäure monohydrat, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser

Spray: Glycerol, Nonoxinol 9, Dinatriumhydrogenphosphat dihydrat, Citronensäure monohydrat, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser

Salbe: Macrogol 400, Macrogol 4000

Uterus-Tabletten: Laktose, Gelatine, mikrokristalline Cellulose, Crospovidon, Talk, Stearinsäure

Lösung 10 %: rotbraune Lösung mit schwach iodigem Geruch

Spray: rotbraune Sprühlösung mit schwach iodigem Geruch

Salbe: rotbraune, wassermischbare Salbe mit schwach iodigem Geruch

Uterus-Tabletten: helle, rötlich-braun gesprenkelte Obletten von halbmattem Aussehen, beinahe geruchlos

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)



Desinfektionsmittel für Tiere (bakterizid-fungizid-prototoozid-sporozid-viruzid)

Vetisept Lösung 10 % / Vetisept Spray

Allgemein: Desinfektion von Händen, Haut und Operationsfeld, Reinigung von Wunden bei Hautverletzungen und Schürfungen, Hautinfektionen verursacht durch Bakterien, Pilze und Viren, Behandlung von Infektionen bei Verbrennungen
Behandlung von frischen und schlecht heilenden Wunden, Abszessen, Nabeldesinfektion bei Neugeborenen

Pferd: Hufbehandlung (z. B. Nageltritt), Mauke

Rind: Klauenbehandlung (z. B. Rusterholz-Geschwür, Limax, Panaritium, Klauenamputationen), Euterpocken, Euterschenkeleczem, Haut-Pilze («Flechten Gebärmutterschleimhautentzündung), Pyometra (Gebärmuttervereiterung Gebärmutterschleimhautentzündung), Vaginitis (Scheidenentzündung), Prolapsus uteri (Gebärmuttervorfall), geburtsbedingte Verletzungen

Schaf, Ziege: Moderhinke, Lippengrind

Hund, Katze: Bisswunden, Otitis externa (Entzündung des äusseren Gehörgangs) (Spülung und Instillationen), Posthitis (Vorhautentzündung), Stomatitis (Maulschleimhautentzündung), Akne, Furunkulose (Haarfollikelentzündung), Haut-Pilze (Dermatomykosen)

Vetisept Salbe

Allgemein: Zur Verhütung von Infektionen bei Verletzungen und Schürfungen, bei durch Bakterien und durch Pilze verursachte Dermatitis (Hautentzündungen), gegen Infektionen bei leichten Verbrennungen

Pferd: Couronnement und Satteldruckschäden

Rind: Wunden aller Art, Zitzenverletzungen

Hund, Katze: Bisswunden, Akne, Furunkulose (Haarfollikelentzündung), Haut-Pilze (Dermatomykosen)

Vetisept Uterus-Tabletten (Gebärmutter Tabletten)

Rind: Vorbeugung und Therapie von Puerperal-Infektionen (Infektionen während Zeit nach der Geburt), Retentio secundinarum (Nachgeburtverhalten) und Endometritis (Gebärmutterschleimhautentzündung)

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil
- bei Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion) oder anderen Schilddrüsenerkrankungen
- bei bestehenden Nierenerkrankungen
- intraoperativ

6. NEBENWIRKUNGEN

Die chronische Einwirkung von Iod kann zu Iodallergien (Iodekzem) führen.

Allergische Reaktionen gegenüber Iod können sich als allergische Hautreaktionen oder auch als anaphylaktischer Schock manifestieren.



Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin / Ihrem Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Alle Tiere

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Vetisept Lösung 10 %

Chirurgie (Operationen) / Dermatologie (Hautkrankheiten): unverdünnt, lokal, so oft als nötig wiederholen

Gynäkologie:

Rind:

- Sterilitätsbehandlung: 10 - 30 ml intrauterin (in die Gebärmutter), bei Bedarf mit Wasser verdünnen.
- Puerperalstörungen: 30 - 50 ml intrauterin (in die Gebärmutter), bei Bedarf mit Wasser verdünnen.

Vetisept Spray

Zu behandelnde Stelle besprühen bis sie gleichmässig bedeckt ist. Nach Anweisung des Tierarztes täglich mehrmals wiederholen.

Vetisept Salbe

Je nach Bedarf ein- bis dreimal täglich auf die betroffene Stelle auftragen; sofern notwendig, kann ein Deckverband angelegt werden. Die Salbe ist fettfrei und abwaschbar.

Vetisept Uterus-Tabletten (Gebärmutter Tabletten)

2 - 3 Uterus-Tabletten intrauterin (in die Gebärmutter) einlegen.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Die keimtötende Wirkung von PVP-Jod tritt sofort ein und hält lange an. Solange die goldbraune Farbe sichtbar ist, bleibt Vetisept voll wirksam. Es reizt weder Haut noch Schleimhäute. Der desinfizierende Effekt wird durch kaltes Wasser nicht herabgesetzt und bleibt auch in Gegenwart von Seifen, Detergentien und Fetten erhalten.

Flecken auf Händen und Textilien können mit Wasser und Seife leicht entfernt werden.

10. WARTEZEIT(EN)

Keine

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Bei Raumtemperatur lagern (15 – 25°C).

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit «EXP.» angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Polyvidon-Iod sollte nicht langdauernd oder wiederholt an hoch differenzierten Geweben wie Muskulatur, Sehnen, Nerven und Knorpelgewebe eingesetzt werden.



Die desinfizierende Wirkung von Iod wird durch alkalische und eiweisshaltige Substanzen wie Blut- und Eiterbestandteile beeinträchtigt, daher sollte vor der Anwendung von Polyvidon-Iod eine Wundspülung bzw. -reinigung erfolgen.

Das Ablecken der behandelten Fläche ist mit geeigneten Mitteln zu verhindern.

Die Wunddesinfektion am Euter soll unmittelbar nach dem Melken erfolgen.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwenderin / den Anwender:

Dieses Arzneimittel kann Reizungen von Augen, Haut und Atemwegen verursachen. Augenkontakt ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt diese sofort mit reichlich klarem Wasser spülen.

Hautkontakt ist zu vermeiden. Exponierte Hautbereiche waschen. Einatmen von Sprühnebel vermeiden.

Jodexposition kann zur Sensibilisierung führen. Da das Tierarzneimittel bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Jod eine allergische Reaktion auslösen kann, wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Nicht mit anderen Desinfektionsmitteln anwenden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Nach versehentlicher oraler Aufnahme grosser Mengen des Tierarzneimittels können Symptome einer akuten Iod-Vergiftung wie schwere Gastroenteritis (Magen-Darmentzündung) mit Durchfall und Erbrechen, Nierenschädigung, Kreislaufversagen, Dehydratation (Austrocknung) und Schock auftreten.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihre Tierärztin / Ihren Tierarzt oder Ihre Apothekerin / Ihren Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

17.11.2021

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.swissmedicinpro.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Polyvinylpyrrolidon-Jod (PVP-Jod) ist ein organischer Komplex aus Jod und einem wasserlöslichen Polymer. PVP wirkt als Lösungsvermittler, Stabilisator und Schutzkolloid. Es bewirkt, dass das Jod erst am Applikationsort freigesetzt wird. PVP-Jod hat das volle und breite Wirkungsspektrum von Jod, ist jedoch weniger toxisch (giftig), stabiler und wasserlöslich. Es wirkt bakterizid (bakterienabtötend), fungizid (pilzabtötend), protoozid (protozoenabtötend), sporozid (sporenabtötend) und viruzid (virenabtötend).

Vetisept Lösung 10 %: 120 ml, 220 ml, 1 Liter und 5 Liter

Swissmedic 50'513 ATCvet-Code: QD08AG02

Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung

Vetisept Spray: 170 ml

Swissmedic 50'516 ATCvet-Code: QD08AG02

Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung



Vetisept Salbe: 20 g, 100 g und 450 g

Swissmedic 50'515 ATCvet-Code: QD08AG02

Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung

Vetisept Uterus-Tabletten: 10 Uterus-Tabletten

Swissmedic 50'514 ATCvet-Code: QG51AD01

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrössen in Verkehr gebracht.

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der in der Rubrik 1 genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.

