

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

AmoxiCat® 40 ad us. vet., comprimés sécables pour chats

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch.

Fabricant responsable de la libération des lots : Ceva Santé Animale, Boulevard de la communication, Zone autoroutière, 53950 Louverné, France.

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

AmoxiCat® 40 ad us. vet., comprimés sécables pour chats.

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient :

Substance active :

Amoxicilline (sous forme A. trihydrate) 40 mg

Comprimés ronds, beiges, incisés en forme de croix, pouvant être divisés en deux moitiés.

4 INDICATION(S)

Traitement des infections à germes sensibles à l'amoxicilline chez le chat.

5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas administrer AmoxiCat® 40 aux chats présentant une hypersensibilité aux pénicillines.

Ne pas administrer aux lapins, cobayes, hamsters ou gerbilles.

Ne pas utiliser chez les animaux présentant une insuffisance rénale sévère accompagnée d'une production d'urine réduite ou absente.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Des troubles digestifs tels que diarrhées, nausées, vomissements peuvent être observés.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chats.

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

A administrer par la gueule.

1 comprimé d'AmoxiCat[®] pour 4 kg de poids corporel (soit 10 mg d'amoxicilline par kg de poids corporel) toutes les 12 heures pendant 5 jours.

Schéma posologique :

Poids (P) du chat en kg	Nombre de comprimés à administrer matin et soir	Dose (mg/kg)
1,5 < P <= 2,5	½ comprimé	8,0-13,3
2,5 < P <= 4,5	1 comprimé	8,9-16,0
4,5 < P <= 6,5	1 ½ comprimés	9,2-13,3
6,5 < P <= 8,5	2 comprimés	9,4-12,3

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Sans objet.

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte.

La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible : Comme les comprimés sont aromatisés, il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent et les absorbent accidentellement. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux : Le principe actif de l'AmoxiCat[®] et les principes actifs associés (pénicillines et céphalosporines) peuvent provoquer une hypersensibilité (allergie) suite à leur inhalation, ingestion ou au contact avec la peau. Les réactions allergiques à ces substances peuvent être graves.

En cas d'hypersensibilité, éviter tout contact avec le produit.

En cas d'apparition de rougeurs cutanées, prendre l'avis du médecin.

En cas d'apparition d'œdème du visage, des lèvres et des yeux ou en cas d'apparition d'une difficulté respiratoire, consulter immédiatement un médecin.

Se laver les mains après utilisation du produit.

Gestation et lactation : Les études sur les animaux de laboratoire n'ont montré aucun risque de malformations de l'embryon.

L'innocuité du médicament pendant la gestation ou la lactation n'a pas été étudiée. A utiliser chez les femelles en gestation ou allaitantes uniquement en fonction de l'évaluation du rapport bénéfice/risque réalisé par le vétérinaire.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions : Le médicament ne doit pas être utilisé en même temps que certains autres antibiotiques (par exemple de la famille des tétracyclines).

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) : Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles devront faire l'objet d'un traitement symptomatique.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

15.06.2021

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Etui de 1 ou 10 blisters de 12 comprimés sécables.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire.

Swissmedic 52'869.

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.