

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

AmoxiCat® 40 ad us. vet., compresse divisibili per gatti

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

Titolare dell'omologazione: Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch.

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Ceva Santé Animale, Boulevard de la communication, Zone autoroutière, 53950 Louverné, Francia.

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

AmoxiCat® 40 ad us. vet., compresse divisibili per gatti.

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene:

Principio attivo:

Amoxicillina (sotto forma di a. triidrato) 40 mg

Comprese rotonde, di colore beige, con un'incisione a croce, divisibili in due metà.

4. INDICAZIONE(I)

Trattamento di infezioni causate da microrganismi sensibili all'amoxicillina nei gatti.

5. CONTROINDICAZIONI

AmoxiCat® 40 non deve essere somministrato a gatti con ipersensibilità alla penicillina.

Non somministrare a conigli, cavie, criceti o gerbilli.

Non usare in animali con gravi disturbi della funzionalità renale accompagnati da produzione di urina scarsa o assente.

6. EFFETTI COLLATERALI

Si possono osservare disturbi della digestione quali diarrea, nausea e vomito.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatti.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Da somministrare per bocca.

1 compressa di AmoxiCat[®] 40 per 4 kg di peso corporeo (corrisponde a 10 mg di amoxicillina per kg di peso corporeo) ogni 12 ore per 5 giorni. Schema di dosaggio:

Peso del gatto (G) in kg	Numero di compresse da somministrare al mattino e alla sera	Dose (mg/kg)
1,5 < G ≤ 2,5	½ compressa	8,0-13,3
2,5 < G ≤ 4,5	1 compressa	8,9-16,0
4,5 < G ≤ 6,5	1 ½ compresse	9,2-13,3
6,5 < G ≤ 8,5	2 compresse	9,4-12,3

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Non pertinente.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15°C - 25°C).

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sul contenitore con la dicitura EXP.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione: poiché il medicamento veterinario è aromatizzato, c'è il rischio che cani e gatti cerchino miratamente le compresse e le assumano in quantità eccessiva. Pertanto il preparato deve essere conservato fuori dalla portata degli animali.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali: il principio attivo di AmoxiCat[®] così come i principi attivi correlati (penicilline e cefalosporine) possono causare ipersensibilità (allergia) dopo inalazione, ingestione o contatto con la pelle.

Le reazioni allergiche a queste sostanze possono essere gravi.

Evitare il contatto con il prodotto in caso di ipersensibilità.

Consultare un medico se la pelle presenta arrossamenti.

Consultare immediatamente un medico in caso di edema del viso, delle labbra e degli occhi o difficoltà nella respirazione.

Lavare le mani dopo l'uso del prodotto.

Gravidanza e allattamento: gli studi sugli animali da laboratorio non hanno rivelato alcun potenziale per malformazioni embrionali.

La sicurezza del medicamento veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita. Da utilizzare in gatte gravide o in allattamento solo sulla base di una valutazione veterinaria del rapporto rischio-beneficio.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione: il medicamento veterinario non deve essere usato insieme a determinati antibiotici (ad es. della famiglia delle tetracicline).

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti): per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

15.06.2021

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Scatola contenente 1 o 10 blister da 12 compresse divisibili ciascuno.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria.

Swissmedic 52'869.

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.