

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.swissmedicinfo-pro.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Frontline® Spot On Chien S ad us. vet., Solution pour spot-on

Frontline® Spot On Chien M ad us. vet., Solution pour spot-on

Frontline® Spot On Chien L ad us. vet., Solution pour spot-on

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Bâle

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Frontline spot on Chien S ad us. vet., Solution pour spot-on

Frontline spot on Chien M ad us. vet., Solution pour spot-on

Frontline spot on Chien L ad us. vet., Solution pour spot-on

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Une pipette contient :

Substance active :

Frontline Spot-on Chien S de 0,67 ml de solution contient 67 mg de fipronil.

Frontline Spot-on Chien M de 1,34 ml de solution contient 134 mg de fipronil.

Frontline Spot-on Chien L de 2,68 ml de solution contient 268 mg de fipronil.

Excipients :

Butylhydroxyanisole (E320) 0,02%

Butylhydroxytoluène (E321) 0,01%

Solution pour spot-on sur la peau.

Solution claire, incolore à jaune-brun.

4 INDICATION(S)

Solution insecticide et acaricide pour chiens.

Pour le traitement des chiens :

- traitement curatif et préventif des infestations par les puces et par les tiques. La durée de protection contre une nouvelle infestation est de 2 mois pour les puces et d'un mois pour les tiques.
- élimination des poux broyeurs
- dans le cadre d'un traitement de l'allergie aux piqûres de puces (dermatite allergique aux piqûres de puces = DAPP).

5 CONTRE-INDICATIONS



Ne pas utiliser chez les animaux malades ou convalescents

Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent se produire.

La taille des pipettes a été spécialement conçue pour les chiens. Ne pas utiliser chez les chats car cela peut entraîner un surdosage.

Ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à un autre composant.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation principalement due à la nature de l'excipient peut être observée.

Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, chute locale des poils, démangeaisons, érythème), ainsi que des démangeaisons généralisées ou une chute des poils ont été rapportés. Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hypersensibilité, abattement, symptômes nerveux), des vomissements et des symptômes respiratoires ont également été observés.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens.

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Pour application sur la peau.

- 1 pipette de 0,67 ml pour un chien de 2 à 10 kg,
- 1 pipette de 1,34 ml pour un chien de 10 à 20 kg,
- 1 pipette de 2,68 ml pour un chien de 20 à 40 kg,

Pour les chiens de plus de 40 kg, utilisez la combinaison de deux tailles de pipettes qui correspond le mieux au poids du chien.

En l'absence de données de tolérance pour des intervalles de traitement plus courts, l'intervalle minimum entre deux traitements ne doit pas être inférieur à 4 semaines.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Tenir la pipette à la verticale. Tapoter légèrement pour que le fluide s'accumule complètement dans la partie principale de la pipette. Casser l'embout de la pipette au niveau de la partie prédécoupée.



Écarter les poils de l'animal entre les omoplates jusqu'à ce que la peau soit visible. Appliquer la pointe de la pipette sur la peau et vider complètement la pipette en un seul point, en appuyant plusieurs fois. Le produit est appliqué entre les omoplates pour éviter le léchage.

10 TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

À conserver à l'abri de l'humidité.

À conserver dans l'emballage d'origine.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur l'étiquette

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible : Eviter le contact avec les yeux de l'animal.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

Il est important de veiller à ce que le médicament à usage vétérinaire soit administré à un endroit que l'animal ne peut pas lécher et de s'assurer que les animaux traités ne puissent pas se lécher mutuellement. Les bains et les immersions dans l'eau dans les deux jours suivant l'application du produit et des bains plus fréquents qu'une fois par semaine doivent être évités.

Des shampooings dégraissants peuvent être utilisés avant le traitement, mais ils réduisent la durée de protection contre les puces à environ 5 semaines s'ils sont utilisés une fois par semaine après l'application du produit. Dans le cadre d'une étude d'une durée de 6 semaines, un bain hebdomadaire avec des shampooings à 2% de chlorhexidine n'a pas eu d'effet sur l'efficacité du produit contre les puces.

Dans des cas isolés, des tiques attachées peuvent être observées même chez les animaux traités. Pour cette raison, la transmission de maladies infectieuses ne peut pas être complètement exclue si les conditions sont défavorables.

Les puces des animaux de compagnie contaminent souvent les paniers, les couvertures et les lieux de repos habituels, comme les tapis et les meubles rembourrés, qui doivent donc être traités en même temps, surtout en cas de forte infestation et au début du traitement. Pour ce faire, il convient d'utiliser des insecticides appropriés et de passer régulièrement l'aspirateur.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Ce médicament vétérinaire peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. Donc éviter tout contact du produit avec la bouche et les yeux.

Éviter le contact du contenu avec les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon.

En cas d'exposition accidentelle des yeux, rincer à l'eau pure avec soin.

Se laver les mains après utilisation.

Ne pas toucher les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à



dormir avec les propriétaires, surtout les enfants.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool devraient éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Gestation et lactation :

Frontline Spot On Chien peut être utilisé chez les chiennes gestantes ou allaitantes.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions : Non connues.

Surdosage (symptômes, mesures d'urgence, antidote) :

Tout surdosage doit être évité. En cas de surdosage, le risque d'apparition d'une intolérance peut augmenter, il est donc important de toujours traiter les animaux avec la taille de pipette approprié à leur poids corporel.

Incompatibilités : Aucune connue.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Le fipronil peut nuire aux organismes aquatiques. C'est pourquoi les étangs, les eaux usées ou les ruisseaux ne doivent pas être contaminés par le médicament vétérinaire ou les emballages vides. Les chiens ne doivent pas être autorisés à nager dans les cours d'eau pendant les deux jours suivant l'application.

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

15.08.2025

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses

www.swissmedic.ch et www.swissmedicinfo-pro.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Tailles d'emballage

S : Boîte de 3 pipettes (1 plaquette de 3 pipettes) de 0,67 ml de solution spot-on chacune

M : Boîte de 3 pipettes (1 plaquette de 3 pipettes) de 1,34 ml de solution spot-on chacune

L : Boîte de 3 pipettes (1 plaquette de 3 pipettes) de 2,68 ml de solution spot-on chacune

Catégorie de remise D: remise en ordonnance sur conseil spécialisé

Swissmedic 53840

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché désigné à la rubrique 1.

