

**INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI**

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

**FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

Frontline Combo® Spot-On gatti e furetti ad us. vet., soluzione

**1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.**

Titolare dell'omologazione: Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60 B, 4057 Basilea

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 4 chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Francia

**2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Frontline Combo® Spot-On gatti e furetti ad us. vet., soluzione

**3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI**

1 pipetta da 0,5 ml di soluzione contiene:

**Principi attivi:**

Fipronil	50,00 mg
(S)-Methoprene	60,00 mg

**Eccipienti:**

Butilidrossianisolo (E320)	0,10 mg
Butilidrossitoluene (E321)	0,05 mg

Soluzione spot-on.

Soluzione color ambra chiara.

**4. INDICAZIONE(I)**

**Gatti e gattini** (età minima 8 settimane, peso minimo 1 kg):

Contro pulci, zecche e/o pidocchi masticatori.

- Elimina le pulci : l'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 4 settimane.
- Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova, delle pupe e delle larve nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per 6 settimane dopo l'applicazione.
- Elimina le zecche: il prodotto ha un'attività nei confronti delle zecche persistente fino a 2 settimane

- Elimina i pidocchi masticatori
- Può essere utilizzato nel programma per il controllo della Dermatite Allergica da Pulce (DAP).

**Furetti** (età minima 6 mesi):

Contro pulci e/o zecche.

- Elimina le pulci. L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 4 settimane.
- Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova, delle pupe e delle larve nate dalle uova deposte dalle pulci adulte.
- Elimina le zecche. Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente per 4 settimane.

### 5. CONTROINDICAZIONI

Non usare su animali malati (es. malattie sistemiche, febbre) o convalescenti (durante la fase di recupero).

Non usare il prodotto nei gattini di età inferiore a 8 settimane e/o di peso inferiore a 1 kg e in furetti di età inferiore a 6 mesi, poiché non esistono analisi con questi parametri.

Nei gattini con meno di 8 settimane di età che entrano in contatto con madri trattate, la potenziale tossicità del medicinale veterinario non è documentata. In questo caso, occorre prestare particolare attenzione.

Non usare su conigli, in quanto possono insorgere intolleranze, anche con possibili esiti fatali.

In assenza di studi, si raccomanda di non usare il prodotto in specie diverse da quelle di destinazione.

Non usare in casi di nota ipersensibilità a un principio attivo o a un eccipiente (ad es., rimedi contro gli insetti o alcol).

### 6. EFFETTI COLLATERALI

Non superare la dose consigliata.

Tra i fenomeni molto rari di sospette reazioni avverse, sono state descritte transitorie reazioni cutanee al sito di applicazione (desquamazione, locale perdita di pelo, prurito, arrossamento) e prurito diffuso o perdita di pelo dopo applicazione. Sono stati anche osservati molto raramente ipersalivazione, sintomi neurologici reversibili (aumentata sensibilità alle stimolazioni, abbattimento, altri sintomi nervosi) o vomito.

Qualora gli animali si lecchino, si può osservare una transitoria ipersalivazione dovuta principalmente agli eccipienti del prodotto.

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati mostra effetti collaterali durante il trattamento)

- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10 000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

### 7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatti e furetti.

### 8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Applicazione spot-on.

#### **Gatti:**

Una pipetta da 0,5 ml per gatto.

Fra un trattamento e l'altro va rispettato un periodo minimo di 4 settimane, in quanto la tollerabilità non è stata valutata con riferimento a intervalli di trattamento più brevi.

#### **Furetti:**

Una pipetta da 0,5 ml per furetto.

Fra un trattamento e l'altro va rispettato un periodo minimo di 4 settimane.

### 9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Tenere la pipetta in posizione verticale. Picchiettare leggermente in modo tale che il liquido si raccolga completamente nel corpo della pipetta. Piegare la punta della pipetta nella posizione richiesta. A livello della regione cervicale, prima delle scapole, separare il pelo fino a svelare la cute. Posizionare la punta della pipetta sulla cute e svuotare completamente il contenuto premendo più volte in una zona della cute.

### 10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

### 11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere i medicinali fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Conservare nella confezione originale.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP.

### 12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione: Evitare il contatto con gli occhi degli animali.

### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

È importante che il prodotto sia applicato in una zona in cui l'animale non riesca a leccarsi e fare attenzione affinché gli animali non si lecchino l'un l'altro dopo il trattamento.

Nei gatti non sono disponibili informazioni di quanto immersioni in acqua o bagni possano interferire sull'attività del prodotto. Comunque, in base ai dati ottenuti da cani lavati a partire da 2 giorni dopo l'applicazione del prodotto, si consiglia di evitare i bagni nei 2 giorni successivi l'applicazione del prodotto.

Anche negli animali trattati possono verificarsi casi di aspirazione di singole zecche. In condizioni sfavorevoli, la trasmissione di malattie infettive non può pertanto essere completamente esclusa. Le pulci sugli animali domestici spesso contaminano ceste, coperte e le zone in cui l'animale riposa abitualmente, come tappeti e divani, che devono essere trattati, soprattutto in caso di infestazioni gravi e nella fase iniziale. Si possono utilizzare appositi rimedi contro gli insetti e aspirare regolarmente i tessuti contaminati.

### Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Il prodotto può provocare irritazione alle mucose e agli occhi. Si consiglia quindi di evitare il contatto con la bocca e con gli occhi.

Evitare il contatto con le dita. In caso di contatto, lavare le mani con acqua e sapone. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita.

Non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a che il sito di applicazione non sia asciutto. Si consiglia quindi di non trattare gli animali durante il giorno, ma di trattarli alla sera e, se appena trattati, di non farli dormire con i proprietari, in particolare con i bambini. Non fumare, bere o mangiare durante l'applicazione.

Le persone con nota ipersensibilità nei confronti di insetti (insetticidi) o alcool devono evitare il contatto con il medicinale veterinario.

### Gravidanza e allattamento:

**Gatti:** Studi di laboratorio nei gatti non hanno prodotto alcuna prova di malformazioni o effetti nocivi sul feto o sulla madre. Il prodotto può essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento. Per il trattamento nel periodo dell'allattamento, vedi le controindicazioni (paragrafo 5) di cui sopra.

**Furetti:** La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita.

Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio-beneficio della veterinaria/del veterinario curante.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione: Nessuna conosciuta.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Non superare la dose consigliata.

**Gatti:** Negli studi di innocuità non sono stati osservati effetti collaterali nei gatti e gattini di 8 settimane e più di età e con peso di circa 1 kg, trattati una volta al mese a dosi cinque volte superiori alla dose raccomandata per sei mesi consecutivi. In caso di sovradosaggio, tuttavia, il rischio di intollerabilità può aumentare.

Il sovradosaggio del medicinale veterinario può conferire al pelo un aspetto vischioso nel sito di applicazione. In caso di insorgenza, l'effetto scompare entro 24 ore dal trattamento.

**Furetti:** In furetti di 6 mesi e più di età trattati ogni 2 settimane per quattro volte, a dosi cinque volte superiori alla dose raccomandata, si è osservata, in alcuni soggetti, una diminuzione del peso corporeo. Nello studio di tollerabilità, la diarrea è risultata un effetto relativamente comune.

Incompatibilità: Nessuna conosciuta

### **13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/a veterinaria/ veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Frontline Combo non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici.

Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

### **14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

21.12.2022

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### **15. ALTRE INFORMAZIONI**

Scatola con 3 pipette (1 blister da 3 pipette) o 6 pipette (2 blister da 3 Pipette) da 0,5 ml.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 56044

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.