

## INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Inflacam<sup>®</sup> 1,5 mg/ml ad us. vet., sospensione orale per cani

#### 1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon

Domicilio: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,  
Loughrea, Co. Galway, Irlanda

#### 2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Inflacam 1,5 mg/ml ad us. vet., sospensione orale per cani

#### 3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 ml di sospensione orale contiene:

##### Principio attivo:

Meloxicam 1,5 mg

##### Eccipiente:

Sodio benzoato (E211) 5,0 mg

Sospensione per somministrazione orale di colore da crema a giallastro.

#### 4 INDICAZIONE(I)

Antinfiammatorio non steroideo (FANS) per cani.

Per il trattamento di patologie acute e croniche dell'apparato muscolo-scheletrico, come alterazioni della colonna vertebrale e dei dischi intervertebrali, patologie articolari, contusioni, distorsioni, stiramenti, zoppie e processi infiammatori dolorosi dell'apparato muscolo-scheletrico in generale.

## 5 CONTROINDICAZIONI

Inflacam 1,5 mg/ml non deve essere utilizzato:

- in caso di ipersensibilità nota al principio attivo o a un eccipiente;
- in cagne in allattamento o in gravidanza;
- in animali con disturbi cardiaci, epatici o renali clinicamente manifesti e nei cani con possibilità di ulcere gastrointestinali o emorragie;
- in animali con comprovati disturbi della coagulazione del sangue; e
- in animali di età inferiore alle 6 settimane.

## 6 EFFETTI COLLATERALI

Gli effetti collaterali tipici dei farmaci antinfiammatori non steroidei (soprattutto nei primi 5 – 14 giorni di trattamento), come perdita di appetito, vomito, diarrea, feci catramose, svogliatezza e insufficienza renale, sono prevedibili.

Questi effetti collaterali sono nella maggior parte dei casi temporanei e si attenuano dopo l'interruzione del trattamento, ma possono anche essere gravi o pericolosi per la vita in singoli casi se non vengono osservati.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

## 7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

## 8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE





*Trattamento iniziale*

Dose singola di 0,2 mg di meloxicam per kg di peso corporeo.

*Terapia di mantenimento*

Dal giorno 2, utilizzare 0,1 mg di meloxicam per kg di peso corporeo per via orale una volta al giorno (intervallo di 24 ore). Questo regime di dosaggio dovrebbe essere utilizzato anche per il trattamento a lungo termine.

Il dosaggio del volume da somministrare viene effettuato con la siringa dosatrice.

	<p>Agitare bene!</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posizionare la siringa sul flacone con un movimento rotatorio, ruotare il flacone e ritirare lo stantuffo fino a raggiungere il volume desiderato.</li> <li>2. Regolare il volume richiesto in base al peso corporeo corretto.</li> </ol>
	<p>Riporre il flacone ed estrarre la siringa.</p>
	<p>Aggiungere il contenuto della siringa al mangime.</p>

La durata del trattamento dipende dal decorso clinico della malattia. La risposta clinica si verifica solitamente entro 3 – 4 giorni. Se non si riscontra alcun miglioramento clinico dopo 10 giorni, il trattamento deve essere interrotto.

## 9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Inflacam 1,5 mg/ml deve essere somministrato con il cibo o direttamente in bocca. La prescrizione del veterinario deve essere rigorosamente osservata e il dosaggio prescritto deve essere seguito esattamente. È necessario evitare la contaminazione della siringa di dosaggio e del contenuto del flacone durante l'uso. La sospensione può essere assunta con la siringa dosatrice in dotazione. La siringa ha una graduazione in kg di peso corporeo che corrisponde alla dose di mantenimento di 0,1 mg di meloxicam / kg di peso corporeo.

Agitare bene la sospensione prima dell'uso.

## 10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

## 11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere i medicinali fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15 °C – 25 °C).

Non utilizzare il medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sul contenitore con EXP. Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

## 12 AVVERTENZE SPECIALI

### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Durante il trattamento è necessario garantire un'adeguata assunzione di liquidi. I trattamenti prolungati devono essere eseguiti sotto controllo dello stato ematico. Non utilizzare in animali disidratati, ipovolemici e ipotensi, poiché esiste un rischio potenziale di tossicità renale.

Questo prodotto per cani non deve essere utilizzato nei gatti perché non è adatto a questa specie.

Nei gatti si deve utilizzare il preparato Inflacam<sup>®</sup> 0,5 mg/ml ad us. vet., sospensione orale per gatti, approvato per questa specie.

Come per tutti i farmaci antinfiammatori non steroidei, il trattamento degli animali anziani è associato a un aumento del rischio. Se non è possibile evitare l'uso in tali animali, questo deve avvenire sotto stretta osservazione clinica.

Se si verificano effetti avversi, il trattamento deve essere interrotto e deve essere consultato un veterinario.

### Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico e mostrare il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Le persone con ipersensibilità nota agli antinfiammatori non steroidei devono evitare il contatto con il medicinale veterinario.

### Gravidanza e allattamento:

Inflacam 1,5 mg/ml non deve essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.

### Interazioni con altri medicinali e altre interazioni:

La combinazione di Inflacam 1,5 mg/ml con alcuni altri medicinali (veterinari) può provocare avvelenamento. Questo medicinale veterinario non deve essere co-somministrato con altri farmaci antinfiammatori (antinfiammatori non steroidei o glucocorticoidi). Si deve evitare la somministrazione contemporanea di preparati potenzialmente dannosi per i reni.

Il pre-trattamento con agenti antinfiammatori può causare effetti collaterali aggiuntivi o maggiori, pertanto è necessario osservare un periodo di assenza di trattamento di almeno 24 ore prima di proseguire il trattamento con questi agenti. Nel determinare la durata del periodo senza trattamento, il veterinario deve tenere conto delle proprietà dei preparati precedentemente somministrati.

Sovradosaggio (sintomi, procedura d'emergenza, antidoti):

In caso di sovradosaggio accidentale, il veterinario deve trattare i sintomi.

### **13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/a veterinaria/ veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

### **14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

23.11.2022

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### **15 ALTRE INFORMAZIONI**

Inflacam 1,5 mg/ml ad us. vet., sospensione orale per cani, scatola pieghevole con flacone da 15 ml, inclusa siringa dosatrice

Inflacam 1,5 mg/ml ad us. vet., sospensione orale per cani, scatola pieghevole con flacone da 42 ml, inclusa siringa dosatrice

Inflacam 1,5 mg/ml ad us. vet., sospensione orale per cani, scatola pieghevole con flacone da 100 ml, inclusa siringa dosatrice

Inflacam 1,5 mg/ml ad us. vet., sospensione orale per cani, scatola pieghevole con flacone da 200 ml, inclusa siringa dosatrice

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 62'533

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nel paragrafo 1.