

## **INFORMATION FÜR TIERHALTENDE**

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### **PACKUNGSBEILAGE**

Drontal Plus Tasty ad us. vet., Tabletten für Hunde

**1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSHABERIN UND, WENN  
UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE  
VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaberin:

Vetoquinol AG

Freiburgstrasse 255

3018 Bern

Telefon: 031 818 56 56

Email: [info.switzerland@vetoquinol.com](mailto:info.switzerland@vetoquinol.com)

Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerinnen:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324

DE-24106 Kiel

Europhartech

34 rue Henri Matisse

F – 63370 Lempdes

**2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Drontal Plus Tasty ad us. vet., Tabletten für Hunde

**3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

1 Tablette enthält :

**Wirkstoffe:**

Praziquantel	50 mg
Pyrantel (als 144 mg Pyrantelmeboot)	50 mg
Febantel	150 mg

Eine hellbraune bis braune, mit Fleischgeschmack aromatisierte, knochenförmige, teilbare Tablette zum Halbieren mit Bruchrille auf beiden Seiten.

#### **4. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Zur Behandlung von Rundwürmern (Spul-, Haken- und Peitschenwürmern) und Bandwürmern (darunter *Fuchsbandwurm*, *dreigliedriger Hundebandwurm* und *Gurkenkernbandwurm*) des Hundes.

#### **5. GEGENANZEIGEN**

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einen der sonstigen Bestandteile des Tierarzneimittels.

Nicht anwenden bei Hündinnen in den ersten zwei Dritteln der Trächtigkeit.

Eine einmalige Behandlung im letzten Drittel der Trächtigkeit oder während der Laktation hat sich als verträglich erwiesen.

Nicht anwenden bei Hunden leichter als 2 kg Körpergewicht.

#### **6. NEBENWIRKUNGEN**

In sehr seltenen Fällen (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren) kann es zu leichten, vorübergehenden Beschwerden des Verdauungstraktes (wie z. B. Erbrechen und/oder Durchfall) kommen. In einzelnen Fällen können diese Anzeichen von unspezifischen Symptomen wie Trägheit, Appetitlosigkeit oder erhöhter Aktivität begleitet sein.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

#### **7. ZIELTIERART(EN)**

Hund

#### **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Soweit nicht anders verordnet, werden zur vollständigen Entwurmung 1 Tablette pro 10 kg Körpergewicht verabreicht, was folgenden Wirkstoffmengen pro kg Körpergewicht entspricht: 15 mg Febantel, 5 mg Pyrantel und 5 mg Praziquantel.

Die Dosierung lautet wie folgt:

Körpergewicht (kg)	Anzahl der Tabletten
2 - 5	½
> 5 - 10	1
> 10 - 15	1½
> 15 - 20	2

Für jede weitere 5 kg Körpergewicht muss eine halbe Tablette hinzugegeben werden.

#### *Dauer der Behandlung*

Das Präparat wird einmalig verabreicht. Bei diagnostiziertem Wurmbefall ist immer eine sofortige Entwurmung mit einer Wiederbehandlung nach 2 Wochen durchzuführen.

#### **9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Die Tabletten werden dem Tier direkt verabreicht. Sie sind aromatisiert und werden daher von der Mehrheit der Hunde (88% gemäss einer Studie) freiwillig aufgenommen. Die Tabletten können mit oder ohne Futter verabreicht werden. Diätmassnahmen sind weder bei erwachsenen Hunden noch bei Welpen erforderlich.

#### **10. WARTEZEIT(EN)**

Nicht zutreffend.

#### **11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 30°C lagern.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit «Expiry» angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Halbierte Tabletten, welche nicht am gleichen Tag verbraucht werden, sollen in Aluminium-Folie eingewickelt und in den geöffneten Blister zurückgelegt werden. Aufbrauchfrist der halbierten Tabletten: 7 Tage.

#### **12. BESONDERE WARNHINWEISE**

##### Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Flöhe sind für die Vermehrung des weit verbreiteten Gurkenkernbandwurms (*Dipylidium caninum*) wichtig.

Es kann zu einem erneuten Bandwurmbefall kommen, wenn keine Bekämpfung von Flöhen, Mäusen etc. durchgeführt wird.

##### Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Da das Tierarzneimittel Geschmackstoffe enthält, besteht die Gefahr, dass Hunde und Katzen die Tabletten gezielt aufsuchen und übermäßig aufnehmen. Aus diesem Grund ist das Präparat für Tiere unerreichbar aufzubewahren.

Ferner besteht aufgrund der knochenförmigen Tablettenform Verwechslungsgefahr mit Hundeleckerlies. Aus diesem Grund sollen die Tabletten nur in der Originalverpackung aufbewahrt werden.

Nach häufiger wiederholter Anwendung von Wirkstoffen einer Substanzklasse von Entwurmungsmitteln kann sich eine Resistenz gegenüber der gesamten Substanzklasse entwickeln.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender:

Bei Vorliegen einer Ecchinococcose (Infektion mit dem *Fuchsbandwurm* oder dem *dreigliedrigen Hundebandwurm*) bei Ihrem Hund besteht Ansteckungsgefahr für den Menschen. Hinsichtlich der Behandlung, Nachkontrollen und Personenschutzes sind besondere Richtlinien zu beachten. Hierzu sollte ein spezialisierter Tierarzt oder ein Institut für Parasitologie konsultiert werden.

Trächtigkeit und Laktation:

Nicht anwenden bei Hündinnen in den ersten zwei Dritteln der Trächtigkeit.

Eine einmalige Behandlung im letzten Drittel der Trächtigkeit oder während der Laktation hat sich als verträglich erwiesen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Wegen möglicher Beeinträchtigung der Wirkung soll das Präparat nicht gleichzeitig mit gewissen anderen Entwurmungsmitteln verabreicht werden. Fragen Sie Ihren Tierarzt nach weiteren Informationen.

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Für dieses Tierarzneimittel gibt es keine Untersuchungen zu Überdosierungen. Allfällige Folgen sind symptomatisch zu therapieren.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind.

Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

27.01.2022

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) und [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

**15. WEITERE ANGABEN**

Faltschachteln zu 6, 24 und 102 Tabletten

Packung mit 17 Faltschachteln zu 6 Tabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 66277

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.