

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Canishield S/M ad us. vet., collare medicato per cani di taglia piccola e media

Canishield L ad us. vet., collare medicato per cani di taglia grande

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

Titolare dell'omologazione: Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, Svizzera

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Beaphar B.V., Oude Linderteseweg 9, 8102 EV Raalte, Paesi Bassi

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Canishield S/M ad us. vet., collare medicato per cani di taglia piccola e media

Canishield L ad us. vet., collare medicato per cani di taglia grande

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

Un collare contiene:

Principio attivo:	Canishield S/M (48 cm/19 g) (65 cm/26 g)	Canishield L
Deltametrina	0.77 g	1.04 g

Collare medicato.

Collare nero che rilascia una polvere bianca.

4. INDICAZIONE(I)

Prevenzione dell'infestazione da pulci (*Ctenocephalides felis*) per 4 mesi.

Prevenzione dell'infestazione da zecche (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) per 6 mesi.

Prevenzione delle punture dei flebotomi (*Phlebotomus perniciosus*) per un periodo di 5-6 mesi. I flebotomi, che si nutrono di sangue, trasmettono i patogeni della leishmaniosi.

Prevenzione dei morsi di zanzare adulte della specie *Culex pipiens pipiens* per un periodo di 6 mesi.

5. CONTROINDICAZIONI

Non usare in cuccioli di età inferiore a 7 settimane.

Non usare in cani con lesioni cutanee estese.

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o a uno degli altri eccipienti.

Non usare nei gatti. La deltametrina è estremamente tossica per i gatti. In nessun caso Canishield ad us. vet. può essere usato nei gatti. Possono verificarsi sintomi di avvelenamento pericolosi per la vita, come forti crampi muscolari e disturbi motori, che possono causare la morte del gatto.

6. EFFETTI COLLATERALI

In rari casi sono state osservate reazioni cutanee locali (prurito, arrossamento cutaneo, perdita di pelo) sul collo o sulla cute in generale. In casi molto rari è stato riportato anche un cambiamento del comportamento (ad es. letargia o eccessiva irrequietezza fisica) spesso associato a irritazioni cutanee. In casi molto rari sono stati osservati sintomi gastrointestinali come vomito, diarrea e ipersalivazione. In casi molto rari, sono stati osservati problemi neuromuscolari come disturbi della coordinazione e tremori muscolari. I sintomi generalmente scompaiono entro 48 ore dalla rimozione del collare.

Se uno di questi sintomi si manifesta, occorre rimuovere il collare e consultare un veterinario.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati mostra effetti collaterali durante il trattamento)
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10 000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per uso esterno. Un collare per cane. Il collare può essere usato a partire dall'età di 7 settimane.

Estrarre il collare dalla busta protettiva sigillata e regolarlo attorno al collo del cane in modo che sia comodo. Tra il collare e il collo del cane dovrebbe rimanere uno spazio di due dita. Infilare l'estremità nella fibbia, lasciare 5 cm e tagliare il resto. Verificare periodicamente che il collare non sia troppo allentato o troppo stretto ed eventualmente regolarlo esercitando pressione sulla fibbia e facendo scorrere il collare nella posizione corretta.



9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Non pertinente.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare la busta nella confezione esterna.

Questo medicamento veterinario non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Periodo di validità dopo prima apertura della busta: consumare immediatamente.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Poiché il collare esplica la sua piena efficacia dopo una settimana, dovrebbe essere applicato preferibilmente una settimana prima dell'eventuale infestazione dell'animale.

Le zecche e i flebotomi moriranno e cadranno dall'ospite rispettivamente entro 48 e 24 ore dall'esposizione senza aver consumato un pasto di sangue. In rari casi è possibile che qualche zecca si attacchi all'animale mentre indossa il collare. Ai fini di un controllo ottimale di un'infestazione da pulci in abitazioni dove sono presenti più animali, tutti i cani presenti devono essere trattati in concomitanza. Oltre al trattamento di ogni singolo animale, è consigliabile intervenire in modo appropriato per eliminare le pulci negli ambienti in cui vive il cane.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

In caso di lesioni della cute, rimuovere il collare fino alla scomparsa dei sintomi.

L'effetto di eventuali shampoo sulla durata dell'efficacia non è stato studiato.

Il contatto occasionale con l'acqua non riduce l'efficacia del collare, ma occorre togliere il collare prima di fare il bagno al cane poiché il principio attivo è tossico per i pesci e altri organismi acquatici.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Medicamento, tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che bambini piccoli tocchino il collare, ci giochino o lo portino alla bocca. Ciò significa anche evitare che condividano il letto con cani che indossano il collare.

Dopo aver applicato il collare, lavarsi le mani con acqua fredda e sapone.

La deltametrina è tossica per i pesci e le api. Anche dopo l'uso, il collare non deve essere lasciato nell'ambiente o in corpi d'acqua. I medicinali veterinari non utilizzati devono essere consegnati preferibilmente presso punti di raccolta di sostanze inquinanti. In caso di esposizione orale o

ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

La deltametrina può causare reazioni allergiche in soggetti sensibili. In caso di reazioni di ipersensibilità, consultare un medico.

Gravidanza:

Canishield può essere usato in femmine di cane gravide e che allattano.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

Non usare con altri ectoparassitici contenenti organofosfati.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

In caso di ingestione orale del collare da parte del cane, possono manifestarsi i seguenti sintomi: movimenti scoordinati, tremori, salivazione, vomito e rigidità degli arti posteriori. Questi sintomi scompaiono entro 48 ore. Se i sintomi persistono, è necessario consultare un veterinario.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

24.08.2022

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano sul www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Scatola pieghevole con 1 collare.

Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica

Swissmedic 68904

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.