

## **RABISIN® ad us. vet.**

Inaktivierter adjuvierter Impfstoff gegen Tollwut

### **ZUSAMMENSETZUNG**

1 ml Rabisin enthält:

Inaktiviertes Tollwutvirus (Stamm G52)	$\geq 2.09 \log_{10} \text{OD}_{50}^*$ und $\geq 1 \text{ IE}^{**}$
Aluminium (als Hydroxyd)	1.7 mg

\* Batch Kontrolle mit in vitro ELISA test

\*\* Batch Kontrolle gemäss Ph. Eur Monograph 451.

### **INDIKATIONEN**

Aktive Immunisierung von Hunden, Katzen, Equiden, Wiederkäuer und Frettchen gegen Tollwut.

### **ANWENDUNG UND DOSIERUNG**

Verabreichungsart: i.m. oder s.c.

Dosierung : 1 ml unabhängig von Spezies, Rasse, Gewicht und Alter des Tieres.

Vor Gebrauch schütteln.

#### **Impfschema**

##### **Hunde, Katzen**

###### **Erstimpfung**

Welpen von ungeimpften Müttern: ab einem Alter von 4 Wochen.

Welpen von geimpften Müttern: ab einem Alter von 3 Monaten.

###### **Wiederholungsimpfungen**

Alle 3 Jahre.

Bei Welpen, die im Alter von weniger als 3 Monaten geimpft wurden, muss die erste Wiederholungsimpfung im Alter von 3 Monaten erfolgen.

##### **Equiden**

###### **Erstimpfung**

Fohlen von ungeimpften Müttern: 2 Monate nach der Geburt.

Fohlen von geimpften Müttern: 4 Monate nach der Geburt.

###### **Wiederholungsimpfungen**

Jährlich.

Die erste Nachimpfung erfolgt bei Tieren, die vor dem Alter von 6 Monaten geimpft wurden, im Alter von 1 Jahr.

## **Rinder**

### **Erstimpfung**

Kälber von ungeimpften Müttern: 2 Monate nach der Geburt.

Kälber von geimpften Müttern: 4 Monate nach der Geburt.

### **Wiederholungsimpfungen**

Erste Wiederholungsimpfung: 1 Jahr nach der ersten Injektion.

Weitere Nachimpfungen: alle 2 Jahre.

Die erste Nachimpfung erfolgt bei Tieren, die vor dem Alter von 6 Monaten geimpft wurden, im Alter von 1 Jahr.

## **Schafe, Ziegen**

### **Erstimpfung**

Jungtiere von ungeimpften Müttern: ab einem Alter von 2 Monaten.

Jungtiere von geimpften Müttern: ab einem Alter von 4 Monaten.

### **Wiederholungsimpfungen**

Alle 3 Jahre.

Die erste Nachimpfung erfolgt bei Tieren, die vor dem Alter von 6 Monaten geimpft wurden, im Alter von 1 Jahr.

## **Frettchen**

### **Erstimpfung**

Ab einem Alter von 3 Monaten.

### **Wiederholungsimpfungen**

Jährlich.

## **UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN**

Aluminiumhydroxyd kann die Bildung einer vorübergehenden Schwellung an der Impfstelle verursachen, die nach 8 - 10 Tagen verschwindet.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, melden Sie diese unter [www.vaccinovigilance.ch](http://www.vaccinovigilance.ch).

## **SONSTIGE HINWEISE**

Nur gesunde Tiere impfen.

Übliche aseptische Kautelen beachten.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

## **Lagerung**

Bei +2 °C bis + 8 °C aufbewahren. Vor Licht und Frost schützen.

## **PACKUNGEN**

10 x 1 Dosis in Flaschen.

Abgabekategorie: B

ATCvet-Code: QI99AA02

## **Zulassungsinhaberin**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel

**IVI Nr: 1191**

## **Stand der Information**

Juni 2020