

RABISIN® ad us. vet.

Vaccin inactivé adjuvé contre la rage

COMPOSITION

1 ml de Rabisin contient:

Virus rabique inactivé (souche G52) $\geq 2.09 \log_{10} \text{DO}_{50}^*$ et $\geq 1 \text{ UI}^{**}$

Aluminium (s.f. d'hydroxyde) 1.7 mg

* contrôle de lot réalisé avec un test ELISA *in vitro*

** contrôle de lot effectué conformément à la Ph. Eur monograph 451

INDICATIONS

Immunisation active contre la rage pour les chiens, les chats, les équidés, les ruminants et les furets.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Voie d'administration: i.m. ou s.c.

Dose: 1 ml quels que soient l'espèce, la race, le poids et l'âge de l'animal.

Agiter avant l'emploi.

Schéma de vaccination

Chiens, chats

Primo-vaccination

Issus de mère non vaccinée: dès l'âge de 4 semaines.

Issus de mère vaccinée: dès l'âge de 3 mois.

Rappels

Tous les 3 ans.

Chez les animaux vaccinés avant l'âge de 3 mois, un premier rappel aura lieu à l'âge de 3 mois.

Équidés

Primo-vaccination

Poulains de mère non vaccinée: dès l'âge de 2 mois.

Poulains de mère vaccinée: dès l'âge de 4 mois.

Rappels

Annuels.

Chez les animaux vaccinés avant l'âge de 6 mois, le premier rappel aura lieu à l'âge de 1 an.

Bovins

Primo-vaccination

Veaux de mère non vaccinée: dès l'âge de 2 mois.

Veaux de mère vaccinée: dès l'âge de 4 mois.

Rappels

Premier rappel: 1 an après la première injection.

Rappels ultérieurs: tous les 2 ans.

Chez les animaux vaccinés avant l'âge de 6 mois, le premier rappel aura lieu à l'âge de 1 an.

Ovins, caprins

Primo-vaccination

Issus de mère non vaccinée: dès l'âge de 2 mois.

Issus de mère vaccinée: dès l'âge de 4 mois.

Rappels

Tous les 3 ans.

Chez les animaux vaccinés avant l'âge de 6 mois, le premier rappel aura lieu à l'âge de 1 an.

Furets

Primo-vaccination

Dès l'âge de 3 mois.

Rappels

Annuels.

EFFETS INDESIRABLES

La présence d'hydroxyde d'aluminium peut entraîner l'apparition d'un petit nodule transitoire au point d'injection qui disparaît en 8 - 10 jours.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, il faut les communiquer sous www.vaccinovigilance.ch.

REMARQUES PARTICULIERES

Ne vacciner que les animaux en bonne santé.
Respecter les conditions habituelles d'asepsie.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conservation

Entre +2 °C et + 8 °C. Protéger de la lumière et du gel.

EMBALLAGES

10 x 1 dose en flacon.

Catégorie de remise: B

ATCvet-Code: QI99AA02

Titulaire de l'autorisation

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle

No IVI: 1191

Mise à jour de l'information

Juin 2020