

## 1 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Nobilis® Rismavac ad us. vet., solution à diluer et solvant (Nobilis® Diluent CA) pour la préparation d'une suspension injectable pour poules

## 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

1 dose (0.2 ml) contient:

**Substance active (solution à diluer associée aux cellules, congelée à basse température dans azote liquide):**

Virus herpès des gallinacés (MDV), sérotype 1,  
souche Rispens CVI-988, vivant atténué  $\geq 3.0 \log_{10} \text{DICT}_{50}^*$

(\*)  $\text{DICT}_{50}$ : La quantité de virus, établie statistiquement, dont on peut s'attendre à ce qu'elle infecte 50 pour cent des cultures tissulaires

**Additif:**

Diméthylsulphoxyde 0.08 ( $\pm 0.025$ ) ml

**Excipients:**

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

## 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution à diluer et solvant (Nobilis® Diluent CA) pour la préparation d'une suspension injectable.

## 4. INFORMATIONS CLINIQUES

### 4.1 Espèces cibles

Poules

### 4.2 Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

Immunisation active des poussins d'un jour contre la maladie de Marek.

### 4.3 Contre-indications

Ne pas utiliser chez les animaux malades ou affaiblis.

### 4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Ne pas immuniser la volaille de race ou d'ornement avec ce vaccin.  
Ne vacciner que des animaux en bonne santé.

### 4.5 Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez l'animal  
Sans objet.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Porter des gants et des lunettes de protection pour extraire les ampoules du container d'azote liquide. Il existe un risque d'engelures aux doigts ainsi qu'un risque que les ampoules explosent lors de ce brusque changement de température.

#### **4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité)**

Si des effets indésirables apparaissent, en particulier des effets non décrits dans cette notice d'emballage, veuillez les annoncer à [www.vaccinovigilance.ch](http://www.vaccinovigilance.ch).

#### **4.7 Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte**

Sans objet.

#### **4.8 Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions**

Aucune information n'est disponible concernant l'innocuité et l'efficacité de ce médicament vétérinaire immunologique lorsqu'il est utilisé avec tout autre médicament vétérinaire. Par conséquent, la décision d'utiliser ce vaccin avant ou après un autre médicament vétérinaire doit être prise au cas par cas.

#### **4.9 Posologie et voie d'administration**

##### **Injection s.c. / i.m.**

Diluer 1000 doses de vaccin Nobilis® Rismavac dans 200 ml de solvant (Nobilis® Diluent CA), à température ambiante (15°C - 25°C). Chaque poussin reçoit immédiatement après son éclosion 0,2 ml du vaccin dilué par voie sous-cutanée dans la nuque ou par voie intramusculaire dans la cuisse.

##### **Reconstitution de la solution vaccinale:**

Sortir du container d'azote, en respectant les consignes de sécurité, le nombre d'ampoules nécessaires à la vaccination, juste avant celle-ci. Décongeler le contenu des ampoules sans attendre (dans la minute qui suit) dans un bain-marie à 25°C - 27°C.

##### **Mise en garde: les ampoules sont susceptibles d'exploser lors de brusques changements de température!**

Sécher les ampoules sitôt décongelées, les agiter délicatement et en casser le col (ampoules autocassables). Aspirer dans une seringue stérile (de 5 ou 10 ml) à l'aide d'une aiguille de fort calibre (18 G, Ø 1,2 mm) le solvant (Nobilis® Diluent CA), jusqu'à la moitié du volume de la seringue. Diluer ensuite le contenu d'une ampoule de vaccin avec une portion du solvant (remplir lentement), puis aspirer très lentement la totalité du contenu de l'ampoule dans la dite seringue.

Injecter le contenu de la seringue lentement et soigneusement dans le sachet entamé de solvant (Nobilis® Diluent CA) et mélanger soigneusement le tout en remuant.

Répéter la manœuvre deux fois afin de récolter les résidus de vaccin.

Utiliser du matériel d'injection propre et stérile.

Changer plusieurs fois les aiguilles d'injection pendant la vaccination.

Remuer régulièrement le vaccin pendant la vaccination.

Ne préparer que la quantité de vaccin utilisable dans les deux heures.

Garder le vaccin à l'abri du soleil.

**Important:** Le solvant (Nobilis® Diluent CA) doit être à température ambiante (15°C - 25°C).

#### **4.10 Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire**

Sans objet.

#### **4.11 Temps d'attente**

Zero jours.

### **5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES**

Groupe pharmacothérapeutique: Vaccin virus herpès aviaire, vivant  
Code ATCvet: QI01AD03

#### **5.1 Propriétés pharmacodynamiques**

Sans objet.

#### **5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques**

Sans objet.

### **6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES**

#### **6.1 Liste des excipients**

##### Solution à diluer:

Milieu de culture

Sérum de veau

Traces d'antibiotiques provenant du processus de préparation  
(amphotéricine B, gentamicine, néomycine, polymyxine B)

##### Solvant (Nobilis® Diluent CA):

Saccharose

Phosphate monopotassique

Digestat pancréatique de caséine

Phénolsulfone phtaléine

Eau pour préparations injectables

#### **6.2 Incompatibilités majeures**

Ne pas mélanger avec d'autres médicaments vétérinaires à l'exception du solvant ou d'autres composants recommandés pour être utilisés avec ce médicament vétérinaire immunologique.

#### **6.3 Durée de conservation**

Durée de conservation du médicament vétérinaire immunologique tel que conditionné pour la vente: 60 mois.

Durée de conservation du solvant (Nobilis® Diluent CA) tel que conditionné pour la vente: 24 mois.

Durée de conservation après reconstitution conforme aux instructions: 2 heures.

#### **6.4 Précautions particulières de conservation**

Les ampoules de vaccin doivent impérativement être stockées et transportées dans l'azote liquide. Veiller à remplir régulièrement le container. La chaîne du froid ne doit jamais être interrompue, ou le vaccin perdrait son efficacité.

Solvant (Nobilis® Diluent CA):

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

## **6.5 Nature et composition du conditionnement primaire**

Ampoules de verre de type I

Solvant (Nobilis® Diluent CA): sachet plastique multicouche (MLP)

Présentations:

Ampoules de verre de type I (à 1000 doses)

Solvant (Nobilis® Diluent CA): sachet plastique multicouche (MLP) 200 ml

## **6.6 Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments**

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

## **7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

MSD Animal Health SARL  
Lucerne

## **8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

IVI Nr. 1336

Catégorie de remise: B

## **9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION**

Date de première autorisation: 08.04.1992

Date du dernier renouvellement: 08.12.2019

## **10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE**

11.2019

## **INTERDICTION DE VENTE; DÉLIVRANCE ET/OU D'UTILISATION**

Sans objet.