

## **PUREVAX® FeLV ad us. vet.**

Suspension zur Injektion für Katzen

### **ZUSAMMENSETZUNG**

Eine Dosis zu 1 ml enthält:  
Rekombinanter Kanarienvirus  
vCP97 (FeLV)  $\geq 10^{7,2}$  GKID<sub>50</sub>\*  
Excipient qsp 1 ml

\*Gewebekulturinfektiöse Dosis 50%

### **EIGENSCHAFTEN / WIRKUNGEN**

Der Impfstamm ist ein gentechnisch verändertes Kanarienvirus, das die *env*- und *gag*-Gene des Felines Leukose Virus, Subtyp A (FeLV-A) exprimiert. Unter Feldbedingungen ist nur der FeLV-Subtyp A infektiös. Die Immunisierung gegen den Subtyp A schützt vollständig gegen Infektionen mit den Subtypen A, B und C. Nach der Impfung führt das Virus zur Bildung der für den Impfschutz verantwortlichen Proteine, vermehrt sich jedoch nicht in der Katze. Daher führt der Impfstoff zur Ausbildung einer Immunität gegen das Katzenleukose-Virus.

Die Impfung mit Purevax FeLV ist ab einem Alter von 8 Wochen möglich.

Die Impfung schützt vor persistierender Virämie und den mit einer FeLV-Infektion verbundenen Krankheiten.

Die Dauer der Immunität beträgt 1 Jahr nach der letzten (Wiederholungs-)Impfung.

### **INDIKATIONEN**

Aktive Immunisierung gegen Katzenleukose.

### **ANWENDUNG UND DOSIERUNG**

Eine Dosis von 1 ml ist subkutan entsprechend dem folgenden Impfplan zu verabreichen:

#### ***Grundimmunisierung:***

- erste Injektion: ab einem Alter von 8 Wochen,
- zweite Injektion: 3 bis 5 Wochen später

***Wiederholungsimpfungen:*** jährlich.

### **Hinweise für die richtige Anwendung:**

Der Impfstoff PurevaxR FeLV kann direkt ohne zusätzliches Lösungsmittel mit wahlweise Purevax RC, RCP, RCCh oder RCPCh gemischt werden.

## **ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN**

### **Kontraindikationen**

Der Impfstoff darf nicht bei trächtigen und laktierenden Tieren angewendet werden.

## **NEBENWIRKUNGEN**

Wie bei jedem Impfstoff, kann es unter besonderen Umständen zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen, die symptomatisch behandelt werden sollen. Zeitweilig kann an der Injektionsstelle ein kleiner (bis zu 2 cm grosser) Knoten entstehen, der sich innerhalb von 1 bis 4 Wochen zurückbildet. Vorübergehende Lethargie oder erhöhte Körpertemperatur können während einem Tag, ausnahmsweise an 2 Tagen, auftreten.

## **VORSICHTSMASSNAHMEN**

- Nur gesunde Tiere impfen.
- Es wird empfohlen, vor der Impfung zu untersuchen, ob FeLV-Antigene im Blut vorliegen.
- Nicht mit anderen Impfstoffen oder immunologischen Produkten als Purevax RC, RCP, RCCh oder RCPCh mischen.

## **LAGERUNG**

Kühl lagern (2°C - 8°C). Vor Licht schützen. Nicht einfrieren. Arzneimittel ausser Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

## **WICHTIGE HINWEISE**

Bei versehentlicher Selbstinjektion ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett dem Arzt zu zeigen.

## **HANDELSFORMEN**

Packung mit 10 Dosen: 10 x 1 Flasche Suspension

Abgabekategorie: B

ATCvet-Code: QI06AA01

**Zulassungsinhaberin**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel

**IVI Nr: 1588**

**Stand der Information**

Februar 2007