

PUREVAX® FeLV ad us. vet.

Suspension injectable pour chats.

COMPOSITION

Par dose de 1 ml:

Canarypox recombiné vCP97 (FeLV)	$\geq 10^{7.2}$ DICC ₅₀ *
Excipient qsp	1 ml

* dose infectant 50% de la culture cellulaire.

PROPRIÉTÉS / EFFETS

La souche vaccinale du virus de la leucose féline est un virus canarypox génétiquement modifié exprimant les gènes *env* et *gag* du FeLV-A. Seul le sous-groupe A est infectieux dans des conditions de terrain et l'immunisation vis-à-vis du sous-groupe A induit une protection totale contre les sous-groupes A, B et C. Après inoculation, le virus canarypox exprime les protéines protectrices, mais sans se répliquer chez le chat. Ainsi, le vaccin induit un statut immunitaire contre le virus de la leucose féline.

La vaccination avec Purevax® FeLV est possible à partir de l'âge de 8 semaines. La vaccination protège contre la virémie persistante et les maladies associées à l'infection par le FeLV.

La durée d'immunité est de 1 an après la dernière (re-)vaccination.

INDICATIONS

Immunisation active contre la leucose féline.

POSOLOGIE / MODE D'EMPLOI

Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée selon le calendrier vaccinal suivant:

Primovaccination:

- première injection: à partir de l'âge de 8 semaines,
- deuxième injection: 3 à 5 semaines plus tard.

Rappels: annuels.

Conseils pour une administration correcte:

Le vaccin Purevax® FeLV peut être mélangé directement sans solvant supplémentaire avec Purevax® RC, RCP, RCCh ou RCPCh au choix.

LIMITATIONS D'EMPLOI

Contre-indications

En l'absence d'étude spécifique, le vaccin est contre-indiqué chez les chattes gestantes ou en lactation.

EFFETS INDESIRABLES

Comme pour tout vaccin, une réaction d'hypersensibilité pouvant nécessiter un traitement symptomatique approprié peut exceptionnellement survenir.

Un nodule transitoire de petite taille (< 2 cm) régressant en 1 à 4 semaines peut apparaître au site d'injection. Une léthargie et hyperthermie transitoires peuvent être observées pendant 1 jour, exceptionnellement 2 jours.

PRÉCAUTIONS

- Ne vacciner que les chats en bonne santé.
- Il est recommandé de vérifier le statut antigénique vis-à-vis du FeLV avant la vaccination.
- Ne pas mélanger avec des vaccins ou des produits immunologiques hormis Purevax RC, RCP, RCCh ou RCPCh.

CONSERVATION

A conserver à une température entre +2°C et +8°C, à l'abri de la lumière. Ne pas congeler. A tenir hors de portée et de la vue des enfants.

REMARQUES IMPORTANTES

En cas d'auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquetage.

PRESENTATIONS

Boîte de 10 doses: 10 x 1 flacon de suspension

Catégorie de remise: B

ATCvet-Code: QI06AA01

Titulaire de l'autorisation

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle

No IVI: 1588

Mise à jour de l'information

Février 2007