

EURICAN® HERPES 205 ad us. vet.

Canine Herpesvirose: Inaktivierter Impfstoff

ZUSAMMENSETZUNG

Jede Dosis zu 1 ml Impfstoff enthält:

Canines Herpesvirus (Stamm F205) Antigen	0.3 bis 1.75 µg*
Dünnflüssiges Paraffin	224.8 bis 244.1 mg

*in µg des gB Glykoproteins

INDIKATIONEN

Aktive Immunisierung von Hündinnen, um bei Welpen durch passive Immunität Mortalität, klinische Erkrankung und Läsionen, die durch Infektionen mit dem caninen Herpesvirus in den ersten Lebenstagen hervorgerufen werden, zu verhindern.

DOSIERUNG / ANWENDUNG

Der lyophilisierte Impfstoff muss unmittelbar vor der Injektion mit dem mitgelieferten Lösungsmittel rekonstituiert werden. Verabreichungsart: s.c. - Dosis: 1 ml

Impfschema

1. Impfung: Während der Läufigkeit oder bis zum 10. Tag nach dem Deckzeitpunkt.
2. Impfung: 1 bis 2 Wochen vor dem erwarteten Geburtstermin.

Dieses Impfschema muss bei jeder Trächtigkeit wiederholt werden (2 Injektionen).

ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

Kontraindikationen

Keine.

Vorsichtsmassnahmen

Nur gesunde Tiere impfen.

Aborte und Frühgeburten können in Folge einer CHV-Infektion der Hündin auftreten; der Schutz der Hündin gegen eine Infektion wurde für diesen Impfstoff nicht untersucht. Um eine Immunität auf die Welpen zu übertragen, ist eine ausreichende Aufnahme von Kolostrum erforderlich.

Es liegen keine Untersuchungen zur Wirksamkeit bei gleichzeitiger Anwendung dieses Impfstoffes mit anderen Produkten vor. Deshalb wird empfohlen, in einem Zeitraum von je 14 Tagen vor und nach der Impfung mit diesem Produkt keine anderen Impfstoffe zu verabreichen.

Für den Anwender: Dieses Tierarzneimittel enthält Mineralöl. Eine versehentliche Selbstinjektion kann zu starken Schmerzen und Schwellungen führen. Ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate und zeigen Sie dem Arzt die Packungsbeilage.

UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Wie bei jeder Impfung kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Diese sind allerdings selten und sollten entsprechend symptomatisch behandelt werden.

Die Impfung selbst kann eine vorübergehende Schwellung an der Injektionsstelle bei bis zu 10 % der geimpften Tiere verursachen. Diese Reaktion klingt normalerweise innerhalb einer Woche wieder ab.

Falls unerwünschte Wirkungen auftreten, insbesondere solche die nicht aufgeführt sind, melden Sie diese unter www.vaccinovigilance.ch.

Lagerung

Zwischen 2 °C und 8 °C, vor Licht geschützt. Nicht tiefgefrieren.

PACKUNGEN

Flasche zu 1 Dose lyophilisierten Impfstoffes + 1 Ampulle mit 1 ml Lösungsmittel.

Abgabekategorie: B

ATCvet-Code: QI07AA06

Zulassungsinhaberin

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel

IVI Nr: 1604

Stand der Information: April 2016