

EURICAN® HERPES 205 ad us. vet.

Herpès-virose canine: Vaccin inactivé

COMPOSITION

Chaque dose de 1 ml de vaccin contient:	
Antigènes de l'herpès canin (souche F205)	0.3 à 1.75 µg *
Huile légère de paraffine	224.8 à 244.1 mg

*exprimés en µg de glycoprotéines gB

INDICATIONS

Immunisation active des chiennes afin de prévenir, par immunité passive chez les chiots, la mortalité, les signes cliniques et les lésions causés par l'herpès-virose canine contractée durant les premiers jours qui suivent la naissance.

POSOLOGIE / MODE D'EMPLOI

Le vaccin doit être reconstitué avec le solvant immédiatement avant l'injection.

Voie d'administration: s.c. - Dose: 1 ml.

Schéma de vaccination

1ère injection: pendant les chaleurs, ou jusqu'à 10 jours après la date de saillie.

2ème injection: 1 à 2 semaines avant la date prévue de mise-bas.

A chaque gestation, répéter les deux injections selon le même schéma vaccinal.

LIMITATIONS D'EMPLOI

Contre-indications

Aucune.

Précautions

Ne vacciner que les chiennes en bonne santé.

Des avortements spontanés et des mises-bas prématurées peuvent avoir lieu suite à une infection par l'herpès-virus canin (CHV) chez les chiennes gestantes. La protection des chiennes gestantes contre l'infection n'a pas été étudiée pour ce vaccin. Afin de permettre à

l'immunité d'être transmise aux chiots, la prise d'une quantité suffisante de colostrum par ces derniers est nécessaire.

Aucune information n'est disponible concernant l'efficacité de ce vaccin lors de l'administration simultanée avec un autre produit. Il est par conséquent recommandé de ne pas administrer d'autre vaccin pendant les 14 jours qui précèdent et qui suivent la vaccination.

Pour l'utilisateur: ce produit contient de l'huile minérale. L'auto-injection accidentelle, même en quantité minime, peut provoquer de fortes douleurs et un gonflement. Demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice.

EFFETS INDESIRABLES

Comme pour tout vaccin, une réaction d'hypersensibilité pouvant nécessiter un traitement symptomatique approprié peut exceptionnellement survenir.

L'injection du vaccin peut entraîner, au site d'injection, un œdème transitoire affectant jusqu'à 10% des animaux qui disparaît en moins d'une semaine.

Si vous remarquez des effets indésirables, en particulier d'autres que ceux mentionnés ci-dessus, il faut les communiquer sous www.vaccinovigilance.ch.

Conservation

Entre 2 °C et 8 °C, à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.

PRESENTATION

Emballage de 1 flacon de 1 dose de vaccin lyophilisé + 1 ampoule de 1 ml de solvant.

Catégorie de remise: B

ATCvet-Code: QI07AA06

Titulaire de l'autorisation

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle

No IVI: 1604

Mise à jour de l'information: Avril 2016