

ProteqFlu™-Te ad us. vet.

Suspension injectable pour chevaux

COMPOSITION

Une dose de 1 ml contient:

Principes actifs:

Virus canarypox recombiné

Grippe A/equi-2/Ohio/03 [H3N8] (vCP2242).....5.3 log₁₀ FAID₅₀*

Virus canarypox recombiné

Grippe A/equi-2/Richmond/1/07 [H3N8] (vCP3011)..... 5.3 log₁₀ FAID₅₀*

* dose infectieuse 50% par immunofluorescence

Anatoxine *Clostridium tetani* 30 U.I./ml**

** taux d'anticorps antitoxiniques obtenu dans du sérum de cobaye après des vaccinations répétées selon la Ph. Eur.

Adjuvant:

Carbomère.....4 mg

PROPRIETES

Le vaccin stimule l'immunité active contre la grippe équine et le tétanos.

Les souches vaccinales vCP2242 et vCP3011 sont des virus canarypox génétiquement modifiés exprimant le gène de l'hémagglutinine (HA) des souches virales de la grippe équine, respectivement A/equi-2/Ohio/03 (souche américaine, sous-lignée Florida, clade 1) et A/equi-2/Richmond/1/07 (souche américaine, sous-lignée Florida, clade 2). Après inoculation, les virus expriment les protéines protectrices, mais sans se répliquer chez le cheval. Ainsi, ces composants induisent l'immunité contre le virus de la grippe équine (H3N8).

INDICATIONS

Immunisation active des chevaux âgés de 4 mois et plus contre la grippe équine afin de réduire les signes cliniques et l'excrétion virale après infection, et contre le tétanos afin de prévenir la mortalité.

Mise en place de l'immunité: 14 jours après primo-vaccination.

Durée d'immunité induite par le schéma vaccinal:

- 5 mois après la primo-vaccination;
- après la primo-vaccination et l'injection de rappel 5 mois plus tard: 1 an pour la grippe équine et 2 ans pour le tétanos.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Administrer une dose (1 ml) de vaccin par injection intramusculaire, de préférence dans le cou, selon les modalités suivantes:

- Primo-vaccination avec ProteqFlu-Te: première injection à partir de l'âge de 5 à 6 mois, seconde injection 4 à 6 semaines plus tard.
- Rappels: 5 mois après la primo-vaccination avec ProteqFlu-Te; puis:
 - contre le tétanos: injection de 1 dose de ProteqFlu-Te dans un intervalle maximum de 2 ans;
 - contre la grippe équine: injection de 1 dose tous les ans, alternativement avec ProteqFlu ou ProteqFlu-Te, en respectant un intervalle maximum de 2 ans pour la valence tétanos.

En cas de risque accru d'infection ou de prise de colostrum insuffisante, une injection initiale supplémentaire de ProteqFlu-Te peut être administrée à l'âge de 4 mois, suivie du programme vaccinal complet (primovaccination à l'âge de 5 à 6 mois suivie d'un rappel 4 à 6 semaines plus tard).

Peut être utilisé pendant la gestation et l'allaitement.

Contre-indications

Aucune.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Une tuméfaction transitoire régressant généralement en 4 jours peut apparaître au point d'injection. Dans des cas rares, la tuméfaction peut atteindre jusqu'à 15-20 cm de diamètre et durer 2-3 semaines, ce qui peut nécessiter un traitement symptomatique.
- Une douleur, une hyperthermie locale et une raideur musculaire peuvent être observées dans de rares cas.

- Dans des cas très rares, une abcédation peut survenir.
- Une hyperthermie légère (max. 1,5 °C) peut survenir pendant 1 jour, exceptionnellement 2 jours.
- Dans des cas exceptionnels, une apathie et une baisse d'appétit peuvent être observées le lendemain de la vaccination.
- Dans des cas exceptionnels, une réaction d'hypersensibilité peut survenir, pouvant nécessiter un traitement symptomatique approprié.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, il faut les communiquer sous www.vaccinovigilance.ch.

Précautions

- Ne vacciner que des animaux en bonne santé.
- Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments vétérinaires.
- Un matériel stérile et dépourvu de toute trace d'antiseptique et/ou de désinfectant doit être utilisé pour administrer le vaccin.
- Agiter doucement le vaccin avant emploi.

DELAI D'ATTENTE

Zéro jour.

REMARQUE IMPORTANTE

En cas d'auto-injection accidentelle, prenez immédiatement conseil auprès de votre médecin en lui montrant la notice ou l'étiquette.

Conservation

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- A conserver réfrigéré (2°C - 8°C), à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.
- Utiliser immédiatement après ouverture.
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'étiquette et sur l'emballage extérieur.

PRESENTATIONS

Emballage de 1 ou 10 flacons de 1 dose

Catégorie de remise: B

ATCvet-Code: QI05AI01

Titulaire de l'autorisation

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle

No IVI: 1617

Mise à jour de l'information

Octobre 2014