

## **PUREVAX® RCP ad us. vet.**

Lyophilisat et solvant pour suspension injectable

### **COMPOSITION**

Par dose de 1 ml:

#### **Lyophilisat:**

Herpèsvirus atténué de la rhinotrachéite féline (souche FHV F2)	≥ 10 <sup>4,9</sup> DICC <sub>50</sub> <sup>1</sup>
Antigènes inactivés de la calicivirose féline (souches FCV 431 et G1)	≥ 2.0 U. ELISA
Virus atténué de la panleucopénie infectieuse du chat (PLI IV)	≥ 10 <sup>3,5</sup> DICC <sub>50</sub> <sup>1</sup>

#### **Solvant:**

Eau pour préparations injectables	q.s.p. 1 ml
-----------------------------------	-------------

<sup>1</sup> dose infectieuse culture cellulaire 50 %

### **PROPRIETES / EFFETS**

La vaccination avec Purevax® RCP est possible à partir de l'âge de 8 semaines.

La vaccination réduit les signes cliniques après une infection causée par des virus herpès ou calicivirus, et protège contre la panleucopénie.

La mise en place de l'immunité a lieu dès 1 semaine après la primovaccination.

La durée d'immunité après le dernier rappel est de 3 ans pour les valences rhinotrachéite, calicivirose et panleucopénie féline.

Il a été montré que le médicament vétérinaire réduit l'excrétion du calicivirus félin à la mise en place de l'immunité et pendant un an après la vaccination.

### **INDICATIONS**

Immunsation active des chats contre la rhinotrachéite infectieuse féline (herpèsvirus), contre la calicivirose féline et contre la panleucopénie infectieuse féline.

### **POSOLOGIE / MODE D'EMPLOI**

Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée, après reconstitution du vaccin avec le solvant, selon le calendrier vaccinal suivant:

#### **Primovaccination:**

- première injection: à partir de l'âge de 8 semaines,
- seconde injection: 3 à 4 semaines plus tard.

En présence d'un taux élevé en anticorps maternels, le calendrier vaccinal doit être appliqué à partir de l'âge de 12 semaines.

### **Rappels:**

- le premier rappel doit être effectué un an après la primovaccination,
- les rappels suivants doivent être effectués à intervalles de 3 ans maximum pour les valences rhinotrachéite, calicivirose et panleucopénie.

### **Conseils pour une administration correcte**

Utiliser immédiatement après reconstitution.

Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques, hormis le Purevax<sup>®</sup> FeLV.

## **LIMITATIONS D'EMPLOI**

### **Contre-indications**

Ne pas utiliser chez les femelles gestantes.

### **Précautions**

Utiliser seulement chez les chats en bonne santé.

L'utilisation n'est pas recommandée chez les animaux en lactation.

## **EFFETS INDESIRABLES**

Dans des conditions normales d'utilisation, une apathie transitoire, une anorexie ainsi qu'une hyperthermie (pendant 1 ou 2 jours) peuvent être observées. Une réaction locale (légère douleur lors de la palpation, prurit ou œdème léger) peut également apparaître, qui disparaît en 2 semaines.

Comme pour tout vaccin, une réaction d'hypersensibilité pouvant nécessiter un traitement symptomatique approprié peut exceptionnellement survenir.

Si vous remarquez des effets indésirables, en particulier d'autres que ceux mentionnés ci-dessus, il faut les communiquer sous [www.vaccinovigilance.ch](http://www.vaccinovigilance.ch).

## **REMARQUES PARTICULIERES**

### **Conservation**

À conserver à une température entre +2°C et +8°C, à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.  
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Remarques importantes**

En cas d'auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquetage.

## **PRESENTATIONS**

Boîte de 10 doses: Lyophilisat (10 flacons) + solvant (10 flacons)

Catégorie de remise: B

ATCvet-Code: QI06AH09

### **Titulaire de l'autorisation**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle

**No IVI: 1653**

### **Mise à jour de l'information**

Juin 2015