

PUREVAX® RC ad us. vet.

Lyophilisat et solvant pour suspension injectable

COMPOSITION

Par dose de 1 ml:

Lyophilisat:

Herpèsvirus atténué de la rhinotrachéite féline (souche FHV F2) $\geq 10^{4,9}$ DICC₅₀¹

Antigènes inactivés de la calicivirose féline (souches FCV 431 et G1) ≥ 2.0 U. ELISA

Solvant:

Eau pour préparations injectables q.s.p. 1 ml

¹ dose infectieuse culture cellulaire 50 %

PROPRIETES / EFFETS

La vaccination avec Purevax® RC est possible à partir de l'âge de 8 semaines.

La vaccination réduit les signes cliniques après une infection causée par des herpèsvirus ou calicivirus félines.

La mise en place de l'immunité a lieu dès 1 semaine après la primo-vaccination.

La durée d'immunité est d'au moins 3 ans après la dernière revaccination.

Il a été montré que le médicament vétérinaire réduit l'excrétion du calicivirus félin à la mise en place de l'immunité et pendant un an après la vaccination.

INDICATIONS

Immunsation active des chats contre la rhinotrachéite infectieuse féline (herpèsvirus) et contre la calicivirose féline.

POSOLOGIE / MODE D'EMPLOI

Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée, après reconstitution du vaccin avec le solvant, selon le calendrier vaccinal suivant:

Primovaccination:

- première injection: à partir de l'âge de 8 semaines,
- seconde injection: 3 à 4 semaines plus tard.

En présence d'un taux élevé en anticorps maternels, le calendrier vaccinal doit être appliqué à partir de l'âge de 12 semaines.

Rappels:

- le premier rappel doit être effectué un an après la primovaccination,
- les rappels suivants doivent être effectués à intervalles de 3 ans maximum.

Conseils pour une administration correcte

Utiliser immédiatement après reconstitution.

Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques, hormis le Purevax® FeLV.

LIMITATIONS D'EMPLOI**Contre-indications**

Ne pas utiliser chez les femelles gestantes.

Précautions

Utiliser seulement chez les chats en bonne santé.

L'utilisation n'est pas recommandée chez les femelles en lactation.

EFFETS INDESIRABLES

Dans des conditions normales d'utilisation, une apathie transitoire, une anorexie ainsi qu'une hyperthermie (pendant 1 ou 2 jours) peuvent être observées. Une réaction locale (légère douleur lors de la palpation, prurit ou œdème léger) peut également apparaître, mais qui disparaît en 2 semaines.

Comme pour tout vaccin, une réaction d'hypersensibilité pouvant nécessiter un traitement symptomatique approprié peut exceptionnellement survenir.

Si vous remarquez des effets indésirables, en particulier d'autres que ceux mentionnés ci-dessus, il faut les communiquer sous www.vaccinovigilance.ch.

REMARQUES PARTICULIERES**Conservation**

À conserver à une température entre +2°C et +8°C, à l'abri de la lumière. Ne pas congeler. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Remarques importantes

En cas d'auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquetage.

PRESENTATIONS

Boîte de 10 doses: Lyophilisat (10 flacons) + solvant (10 flacons)

Catégorie de remise: B

ATCvet-Code: QI06AH08

Titulaire de l'autorisation

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle

No IVI: 1658

Mise à jour de l'information

Juin 2015