

PUREVAX® RCP FeLV ad us. vet.

Lyophilisat et solvant pour suspension injectable pour chats

COMPOSITION

Par dose de 1 ml:

Lyophilisat:

Herpèsvirus atténué de la rhinotrachéite féline (souche FHV F2)	$\geq 10^{4,9}$ DICC ₅₀ ¹
Antigènes inactivés de la calicivirose féline (souches FCV 431 et G1)	≥ 2.0 U. ELISA
Virus atténué de la panleucopénie infectieuse féline (PLI IV)	$\geq 10^{3,5}$ DICC ₅₀ ¹

Solvant:

Canarypox recombiné vCP97 (FeLV)	$\geq 10^{7,2}$ DICC ₅₀ ¹
Excipient	q.s.p. 1 ml

¹ dose infectieuse culture cellulaire 50 %

PROPRIETES / EFFETS

La vaccination réduit les signes cliniques après une infection causée par des virus herpès ou calicivirus, protège contre la mortalité et les signes cliniques de la panleucopénie et protège contre la virémie persistante et les maladies associées à l'infection par le FeLV.

La souche vaccinale du virus de la leucose féline est un virus canarypox génétiquement modifié exprimant les gènes *env* et *gag* du FeLV-A. Seul le sous-groupe A est infectieux dans des conditions de terrain et l'immunisation vis-à-vis du sous-groupe A induit une protection totale contre les sous-groupes A, B et C. Après inoculation, le virus canarypox exprime les protéines qui induisent la réponse immunitaire, mais sans se répliquer chez le chat. Ainsi, le vaccin induit un statut immunitaire contre le virus de la leucose féline.

La vaccination avec Purevax RCP FeLV est possible à partir de l'âge de 8 semaines. La mise en place de l'immunité a été démontrée 1 semaine après la primovaccination pour les valences rhinotrachéite, calicivirose et panleucopénie infectieuse féline, et 2 semaines après la primovaccination pour la valence leucose féline.

La durée d'immunité après le dernier rappel est de 3 ans pour les valences rhinotrachéite, calicivirose et panleucopénie féline, et de 1 an pour la valence leucose féline.

Il a été démontré que le médicament vétérinaire réduit l'excrétion du calicivirus félin à la mise en place de l'immunité et pendant un an après la vaccination.

INDICATIONS

Immunisation active des chats contre la rhinotrachéite infectieuse féline (herpèsvirus), la calicivirose féline, la panleucopénie infectieuse féline et la leucose féline.

POSOLOGIE / MODE D'EMPLOI

Injecter une dose (1 ml) par voie sous-cutanée, après reconstitution du lyophilisat avec le solvant, selon le calendrier vaccinal suivant:

Primovaccination:

- Première injection: à partir de l'âge de 8 semaines
- Seconde injection: 3 à 4 semaines plus tard

En présence de taux élevés d'anticorps maternels spécifiques contre les valences rhinotrachéite, calicivirose ou panleucopénie, la primovaccination devrait être retardée jusqu'à l'âge de 12 semaines.

Rappels:

- Le premier rappel doit être effectué pour toutes les valences 1 an après la primovaccination.
- Les rappels suivants doivent être effectués: tous les ans pour la valence leucose féline et à intervalles de 3 ans maximum pour les valences rhinotrachéite, calicivirose et panleucopénie.

LIMITATION D'EMPLOI

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les femelles gestantes.

Précautions

- Utiliser seulement chez les chats en bonne santé.
- L'utilisation n'est pas recommandée chez les animaux en lactation.
- Il est recommandé de vérifier le statut antigénique vis-à-vis du FeLV avant la vaccination. La vaccination des chats FeLV-positifs n'apporte aucun bénéfice.
- Ne pas mélanger avec d'autres vaccins à l'exception du solvant fourni pour être utilisé avec ce produit.

EFFETS INDESIRABLES

Dans des conditions normales d'utilisation, une apathie transitoire, une anorexie ainsi qu'une hyperthermie (pendant 1 ou 2 jours) peuvent être observées. Une réaction locale (légère douleur

lors de la palpation, prurit ou œdème léger) peut également apparaître, qui disparaît en 2 semaines.

Comme pour tout vaccin, une réaction d'hypersensibilité pouvant nécessiter un traitement symptomatique approprié peut exceptionnellement survenir.

Si vous remarquez des effets indésirables, en particulier d'autres que ceux mentionnés ci-dessus, il faut les communiquer sous www.vaccinovigilance.ch.

REMARQUES PARTICULIERES

Conseils pour une administration correcte

Utiliser immédiatement après reconstitution.

Conservation

À conserver à une température entre +2 °C et +8 °C, à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

REMARQUES IMPORTANTES

En cas d'auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquetage.

PRESENTATIONS

Boîte de 10 doses, 10 flacons de lyophilisat et 10 flacons de 1 ml de solvant.

Catégorie de remise: B

ATCvet-Code: QI06AH10

Titulaire de l'autorisation

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle

No IVI: 1742

Mise à jour de l'information

Mai 2016