

Informazione per proprietarie e proprietari di animali

Informazione professionale destinata agli operatori può essere consultata sul sito www.tierarzneimittel.ch

1. Nome e indirizzo del titolare dell'omologazione e, se diverso, del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti

Titolare dell'omologazione:

Dr. E. Graeb AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berna

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

aniMedica Herstellungs GmbH, Pappelstrasse 7, 72160 Horb, Germania

2. Denominazione del medicamento veterinario

Enteran ad us. vet., polvere per suini, suinetti, vitelli e agnelli

3. Principi attivi ed altri ingredienti

1 g di polvere contiene:

Principi attivi:

Neomicina (sotto forma di neomicina solfato) 30 mg

Ftalilsulfatazolo 250 mg

Albuminato di tannino 20 mg

Polvere brunastra per la preparazione di una sospensione orale

4. Indicazioni

Antibiotico in polvere per suini, suinetti, vitelli e agnelli

Diarrea nei suini, suinetti, vitelli e agnelli

5. Controindicazioni

Non usare in casi di nota ipersensibilità a un principio attivo o all'eccipiente.

6. Effetti collaterali

Nessuno conosciuto

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario.

7. Specie di destinazione

Suini, suinetti, vitelli e agnelli

8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

Miscelare e somministrare con sufficiente liquido

Suini, vitelli:

1° giorno: 2 bustine o 2 misurini

2° giorno + 3° giorno: 1 bustina o 1 misurino

Suinetti, agnelli:

1° giorno: ½ bustina o ½ misurino

2° giorno + 3° giorno: ¼ bustina o ¼ misurino

9. Avvertenze per una corretta somministrazione

1 misurino = 10 g di polvere

In un po' di tè o acqua tiepida

10. Tempi di attesa

Tessuti commestibili:

Carni suine, suinetti e agnelli, esclusi i reni: 3 giorni

Vitelli, esclusi i reni: 5 giorni

Reni:

Vitelli, suini, suinetto e agnelli: 7 giorni

11. Particolari precauzioni per la conservazione

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente (15 – 25°C).

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata con «EXP.» sul contenitore. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

12. Avvertenze speciali

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

L'uso del medicinale veterinario deve essere accompagnato da una prova di sensibilità (campionamento prima del primo utilizzo) e, se necessario, adattato in base al risultato della prova di sensibilità.

L'uso improprio del medicinale veterinario può favorire resistenza batterica ai principi attivi. Durante il trattamento, assicurarsi che l'animale riceva un adeguato apporto idrico.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

La neomicina ha un ambito terapeutico ristretto; pertanto, per evitare il sovradosaggio, è necessario prestare molta attenzione al dosaggio raccomandato.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Durante la miscelazione e la manipolazione del medicinale veterinario evitare il contatto diretto con la pelle e le mucose.

Durante la miscelazione, è necessario indossare dispositivi di protezione costituiti da indumenti protettivi, guanti, maschere facciali e occhiali.

Non mangiare, bere né fumare durante l'applicazione.

In caso di reazione di ipersensibilità dopo il contatto con il medicinale veterinario (ad es. arrossamento della pelle), consultare un medico. In caso di gravi reazioni di ipersensibilità (ad es. gonfiore del viso, gonfiore degli occhi o gonfiore delle labbra), consultare immediatamente un medico.

Gravidanza ed allattamento:

La sicurezza del medicamento veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

La neomicina contenuta in Enteran riduce l'assorbimento delle penicilline nell'intestino.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

Incompatibilità:

Non pertinente

13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti, se necessario

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/a veterinaria/ veterinario o alla/al propria/o farmacia come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

20.12.2023

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. Altre informazioni

Astuccio contenente 10 bustine da 10 g ciascuna

Barattolo di plastica da 500 g con misurino

Secchio di plastica da 5 kg con misurino

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 27/435

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.