

# Foglio illustrativo

## Informazione per i detentori di animali

Informazione professionale per il personale medico vedi [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

## Foglio illustrativo

### Perlutex ad us. vet., compresse per cani e gatti

#### 1. Nome e indirizzo del titolare dell'omologazione e, se diverso, del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti

##### Titolare dell'omologazione:

Dechra Veterinary Products Suisse GmbH, Messeplatz 10, 4058 Basilea

##### Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Haupt Pharma Münster GmbH, Schleebüggenkamp 15, 48159 Münster, Germania

#### 2. Denominazione del medicamento veterinario

Perlutex ad us. vet., compresse per cani e gatti

#### 3. Principi attivi ed altri ingredienti

Una compressa contiene:

##### Principio attivo:

Medroxyprogesteron. acet. 5 mg (corresp. medroxyprogesteronum 4.45 mg)

Compressa bianca, rotonda con tacca decorativa su un lato

#### 4. Indicazioni

Progestinico orale per cani e gatti

Interruzione e rinvio dell'estro nelle femmine di cane

Prevenzione a lungo termine dell'estro nei gatti

#### 5. Controindicazioni

Perlutex non deve essere utilizzato su:

- animali che non hanno ancora raggiunto la maturità sessuale
- animali destinati alla riproduzione nel prossimo ciclo mestruale successivo al trattamento
- femmine di cane o gatto incinte o con sospetta gravidanza
- in presenza di disturbi riproduttivi nel cane e nel gatto, disturbi mestruali, sospetti disturbi ormonali, suscettibilità all'infiammazione del rivestimento dell'utero o alterazioni infiammatorie dell'utero
- gatti e cani con malattie del fegato o del pancreas
- gatti e cani con diabete (diabete mellito) e/o ingrossamento di parti del corpo
- trattamento a lungo termine degli animali in calore. Il rischio di disturbi uterini può aumentare in questi casi, soprattutto negli animali più anziani
- gatti o cani con tumori degli organi riproduttivi, delle ghiandole mammarie o di altra localizzazione

#### 6. Effetti collaterali

I seguenti effetti collaterali di solito possono verificarsi negli animali subito dopo l'inizio del trattamento:

- aumento dell'appetito e aumento di peso. La quantità di cibo deve essere ridotta, se necessario.
- cambiamenti comportamentali
- ingrandimento mammario

Tali sintomi sono generalmente temporanei.

Effetti collaterali molto rari e indesiderati: ingrandimento del rivestimento dell'utero, tumori delle ghiandole mammarie, soppressione della funzione surrenale, diabete, ingrossamento di parti del corpo. Il rischio di effetti indesiderati è particolarmente elevato quando il preparato viene utilizzato per un trattamento a lungo termine.

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati mostra effetti collaterali durante il trattamento)
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1'000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10'000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10'000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate)

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario.

#### **7. Specie di destinazione**

Cane, gatto

#### **8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione**

Interruzione e rinvio del calore nelle femmine di cane:

Cani di peso corporeo inferiore a 15 kg:

2 compresse al giorno per 4 giorni, poi 1 compressa al giorno per 12 - 14 giorni

Cani di peso corporeo superiore a 15 kg:

4 compresse al giorno per 4 giorni, poi 2 compresse al giorno per 12 - 14 giorni

Gatte:

Prevenzione dell'estro:

1 compressa a settimana

#### **9. Avvertenze per una corretta somministrazione**

È meglio somministrare le compresse prima di nutrire l'animale; è consigliato nascondere le pillole in un boccone del loro cibo preferito.

Il trattamento non dovrebbe essere iniziato mentre la femmina di cane o gatto è in calore.

Le compresse hanno una tacca che non è adatta per dimezzare la compressa.

#### **10. Tempi di attesa**

Non pertinente

#### **11. Particolari precauzioni per la conservazione**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non usare oltre la data espressa sotto la designazione «EXP.» sulla scatola.

Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C) e proteggere dalla luce nella confezione originale.

#### **12. Avvertenze speciali**

Se l'estro di un femmina di cane viene interrotto mediante Perlutex, spesso ci si può aspettare il calore successivo un po' prima del solito. Per le gatte, il tempo necessario per tornare in estro dopo l'interruzione della terapia varia. La terapia a lungo termine (per sopprimere più di un estro) non è raccomandata negli animali da riproduzione.

Si consiglia di isolare la gatta durante un ciclo completo per essere sicuri di iniziare il trattamento con Perlutex prima che entri in calore.

Precauzioni speciali per l'uso negli animali più anziani:

Si raccomanda di eseguire regolarmente il test delle urine per escludere l'escrezione urinaria di glucosio associata al diabete.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Lavarsi le mani dopo la somministrazione.

Gravidanza ed allattamento:

Non somministrare durante la gravidanza o l'allattamento.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi.

#### **13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti, se necessario**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

#### **14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo**

28.07.2022

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

#### **15. Altre informazioni**

Scatola pieghevole con 1 o 3 blister da 20 compresse ciascuno

Swissmedic 37'837

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.