

Stomorgyl® 10 ad us. vet., Tabletten

Tabletten gegen Infektionen bei Hunden und Katzen

ZUSAMMENSETZUNG

Spiramycinum 750'000 I.E. entsprechend 250 mg
Metronidazolium 125 mg
Color.: E 124
Excipients pro compresso

EIGENSCHAFTEN / WIRKUNGEN

Die zwei Aktivsubstanzen von Stomorgyl sind Spiramycin und Metronidazol. Das Wirkungsspektrum ist deshalb sehr breit. Ausserdem verleiht eine ähnliche Kinetik seiner Komponenten mit Konzentration in den Knochengewebe sowie im Speichel dem Stomorgyl eine sehr hohe Wirksamkeit bei der Behandlung von Zahn- und Mundhöhlenerkrankungen. Spiramycin, ein Makrolid-Antibiotikum, ist besonders wirksam gegen die grampositiven Keime (alle Kokken, Listerien), z.T. auch gegen gramnegative Erreger (*Haemophilus*), Mykoplasmen und gewisse Protozoen (Toxoplasmen, Amöben). Metronidazol, ein synthetisches Derivat aus der Familie der Nitro-Imidazole, wirkt nicht nur gegen Flagellaten (Trichomonaden) und Amöben, sondern auch gegen grampositive und gramnegative Anaerobier, einschliesslich gewisser Stämme von *Cl. perfringens*, die oft gegen andere Antibiotika resistent sind.

INDIKATIONEN

Mischinfektionen bei den Fleischfressern, bei denen häufig Anaerobier vorherrschen, insbesondere:

Stomatitiden und Gingivitiden (auch ulzerative), Fistelwunden der Maulhöhle, septische Komplikationen der Ranula, Karies, Zahnfisteln.

Übler Mundgeruch, verschiedene Osteitiden, alveolo-dentäre Pyorrhoe bei der Katze.

Verschiedene Fisteln, insbesondere Analfisteln.

Balanitiden und Balanoposthitiden

DOSIERUNG / ANWENDUNG

Die angezeigte Dosis ist 25 mg Spiramycin und 12,5 mg Metronidazol pro kg Körpergewicht und pro Tag, auf einmal oder auf 2 Gaben aufgeteilt,

d.h.: 1 Tablette Stomorgyl 10/10 kg KGW/Tag.

Behandlungsdauer: 6 - 10 Tage je nach Schweregrad der Erkrankung.

Bei Maulhöhlen-Zahnerkrankungen ist das erste Anzeichen einer Besserung das Verschwinden des Maulgeruches.

Anwendung: Oral.

Die Teilbarkeit der Tabletten ist nicht belegt.

SONSTIGE HINWEISE

Lagerung bei Raumtemperatur (15 - 25 °C).

Die Tabletten sollen für Kinder unerreikbaar gelagert werden.

Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "Exp." bezeichneten Datum verwendet werden.

PACKUNG

Stomorgyl 10: Packung zu 20 Tabletten

Swissmedic Nr. 40'196 (A)

ATCvet-Code: QA01AB20

Zulassungsinhaberin

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel

Stand der Information: Juni 2013