

Forticillin ad us. vet., pommade injectable

Injecteurs de pis pour la suppression de la lactation chez les vaches

Composition

Benzylpenicillinum procainum 1 Mio. U.I.

Benzylpenicillinum kalicum 1 Mio. U.I.

Neomycinum (ut Neomycini sulfas) 525mg

Conserv.: Natrii dehydroacetat 10 mg

Triglycerida media

Polysorbatum 20

pro vase 10 g

Tela cum Solutione 3 mL

Solutio: Benzethonii chloridum 1 mg

Alcohol isopropylicus 600 mg

Aqua q.s. ad Solutionem pro 1 ml

Propriétés/Effets

L'association de pénicilline et de néomycine est particulièrement adaptée au traitement ou à la prophylaxie des infections lors de la suppression de la lactation chez les vaches, en raison de son large spectre d'action. Les pénicillines sont efficaces contre les streptocoques et les staphylocoques ne produisant pas de pénicillinase, ainsi que contre d'autres germes gram positifs, tandis que la néomycine agit sur tous les staphylocoques et la plupart des germes gram négatifs. L'excipient de la pommade développé spécialement pour Forticillin (sans monostéarate d'aluminium) possède une action prolongée marquée et garantit ainsi pendant 5 semaines un taux sanguin d'antibiotiques suffisamment élevé. L'effet retard de la pénicilline procaine peu soluble étant amélioré par la formulation de l'excipient, la pénicilline ne parvient que lentement dans la phase aqueuse du lait. Afin d'atteindre cependant immédiatement après l'injection une dose initiale suffisante de pénicilline soluble dans le lait, Forticillin contient en plus 1 million d'U.I. de benzylpénicilline facilement soluble.

Indications

Prévention et traitement des infections des pis pendant la suppression de la lactation chez les vaches.

Posologie/Mode d'emploi

Traire jusqu'à ce que le pis soit bien vidé. Nettoyer minutieusement le bout de trayon avec une lingette désinfectante. Injecter la totalité du contenu d'un injecteur dans chaque quart. Ne plus traire après le traitement.

Limitations d'emploi

Ne pas utiliser cette préparation pendant la lactation.

Délai d'attente

Si la suppression de la lactation dure moins de 6 semaines, il faut s'assurer que le lait ne possède pas de substances inhibitrices avant de le livrer. Si l'animal est abattu pendant la période de suppression de la lactation, une recherche de substances inhibitrices doit être effectuée dans les tissus comestibles.

Remarques particulières

Aucune incompatibilité physique ou chimique n'est connue. Conserver à température ambiante (15-25° C). Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte. Tenir hors de portée des enfants!

Présentations

Boîte de 4 injecteurs et de 4 lingettes désinfectantes, boîte de 100 injecteurs et de 100 lingettes de désinfectantes

Swissmedic 42'004 (A)

ATCvet Code: QJ51RC23

Mise à jour de l'information: août 2020

Titulaire de l'autorisation

Biokema Sa

Crissier - Lausanne