

PACKUNGSBEILAGE

Starke grüne Salbe ad us. vet., für Nutz- und Heimtiere

**1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN
UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE
VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon, Domizil: Postfach 353, 8152 Glattbrugg
Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller: VIRBAC, 1^{ère} avenue 2065m LID, 06510 Carros,
France

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Starke grüne Salbe ad us. vet., für Nutz- und Heimtiere

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Salbe enthält:

Wirkstoffe:

Dextrocampher	20 mg
Methylsalicylat	25 mg

Sonstige Bestandteile:

Pappelsalbe, Patentblau V (E131), Gelborange S (E110), Natriumhydroxid, Carbomer,
Macroglyglycerolricinoleat, gereinigtes Wasser

Salbe mit grünlicher bis bläulicher Farbe und charakteristischem Geruch, zur äusserlichen
Anwendung

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Salbe zur äusserlichen Anwendung bei Nutz- und Heimtieren. Anwendbar bei Gelenk- und
Muskelleiden, Gelenksentzündungen, Blutergüssen, Abszessen, Nervenentzündungen. Die Starke
grüne Salbe dringt dank ihrer Zusammensetzung in die Tiefe der Gewebe ein. Durch ihre
keimreduzierende, schmerzstillende und durchblutungsfördernde Wirkung trägt sie zur Linderung der
Schmerzen und Behebung eines lokalen Blutandrangs bei.

5. GEGENANZEIGEN

Entzündliche Hauterkrankungen, Ekzeme, Wunden. Kontakt mit den Augen vermeiden, nicht auf Schleimhäute oder verletzte Haut auftragen.

6. NEBENWIRKUNGEN

Vereinzelt kann es zu lokalen Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Zu dickes Auftragen kann zu übermäßig starken Hautreaktionen führen. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Nutz- und Heimtiere

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Salbe 2 – 3 mal täglich einreiben.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Keine Angaben

10. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit nach Anwendung am Euter:

Milch: 3 Tage

Alle übrigen Anwendungen: keine

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern (15°C – 25°C).

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart: Ein Ablecken der Salbe durch die Tiere ist zu vermeiden. Die Anwendung am Euter kann zu einer geschmacklichen Beeinflussung der Milch führen.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender: Bei Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber Azofarbstoffen soll das Präparat mit Vorsicht angewendet werden. Für dieses Tierarzneimittel gibt es keine Untersuchungen zu Überdosierungen. Allfällige Folgen sind symptomatisch zu therapieren.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

26.05.2021.

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Dose zu 450 g / Dose zu 1000 g. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrössen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung. Swissmedic 43'271

Pharmakotherapeutische Gruppe: Topische Produkte gegen Gelenk- und Muskelschmerzen;

Präparate mit Salicylsäurederivaten; ATCvet-Code: QM02AC99

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaber in Verbindung.