

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Pomata verde forte per uso veterinario per animali da reddito e da compagnia

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon, Domicilio: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: VIRBAC, 1^{ère} avenue 2065m LID, 06510 Carros, France

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Pomata verde forte per uso veterinario per animali da reddito e compagnia

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 g contiene:

Principi attivi:

Dextrocampher	20 mg
Metile salicilato	25 mg

Altri componenti:

Unguento di pioppo, blu patentato V (E131), giallo arancio S (E110), sodio idrossido, carbomeri, macroglicerolo ricinoleato, aqua purificata

Pomata per uso esterno di colore da verdastro a bluastro e con un odore particolare

4 INDICAZIONE(I)

Pomata per uso esterno per animali da reddito e da compagnia. Applicabile in caso di affezioni articolari e muscolari, infiammazioni articolari, ematomi, ascessi, nevriti. Grazie ai suoi componenti la pomata verde forte penetra nei tessuti in profondità. Grazie alla sua azione antisettica, antalgica ed iperemizzante, contribuisce all'attenuazione dei dolori ed alla soppressione della congestione locale.

5 CONTROINDICAZIONI

Affezioni cutanee infiammatorie, eczemi, ferite. Evitare il contatto con gli occhi, non applicare sulle mucose o sulla cute lesa.

6 EFFETTI COLLATERALI

Possono verificarsi casi isolati d'ipersensibilità. L'applicazione di uno strato spesso può provocare reazioni cutanee esageratamente intense.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informare il medico veterinario o il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Animali da reddito e da compagnia

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Fare assorbire la pomata tramite massaggio 2 – 3 volte al giorno.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nessuna informazione

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Tempo di attesa dopo l'applicazione della pomata sulla mammella:

latte: 3 giorni

Tutte le altre applicazioni: nessuno

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

12 AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione: Evitare che l'animale leccchi la pomata.

L'applicazione sulla mamella può influenzare il gusto del latte.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali: in caso di reazioni di ipersensibilità verso i coloranti azoici, il prodotto dovrà essere utilizzato con prudenza.

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi relativi ad eventuali sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

26.05.2021

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Barattolo da 450 g / barattolo da 1000 g. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica

Swissmedic 43'271

Gruppo farmacoterapeutico: prodotti topici contro i dolori articolari e muscolari;

Preparativi con derivati di acido salicilico; Code ATCvet: QM02AC99

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.