

Mammaneopen ad us. vet., Suspension

Suspension gegen Mastitis bei Kühen

Zusammensetzung

Benzylpenicillinum procainum 2 Mio. U.I.

Neomycinum (ut Neomycini sulfas) 750 mg

Triglycerida saturata media, Polysorbatum 20

Conserv.: Natrii dehydroacetat 10mg

pro vase 10g

Eigenschaften/Wirkungen

Die Kombination Penicillin/Neomycin bewährt sich sehr gut zur Behandlung von Euterinfektionen, die durch die wichtigsten Mastitiserreger wie nicht Beta-Lactamase bildende pathogene Staphylokokken, Streptokokken, Streptokokkus agalactiae und andere Streptokokken hervorgerufen werden. Die Wirkung von Procainpenicillin auf Streptokokken und nicht Beta-Lactamase-bildende Staphylokokken wird durch Neomycin ergänzt, welches zusätzlich auch auf Beta-Lactamase-bildende Staphylokokken wirkt.

Die Zusammensetzung der Salbengrundlage von Mammaneopen wurde so gewählt, dass die ölige Grundlage mit der wässrigen Phase der Milch emulgiert, ähnlich den natürlichen Fetttröpfchen in der Milch. Die in der öligen Phase suspendierten Wirkstoffe kommen dadurch sofort zur Wirkung.

Indikationen

Akute Mastitiden oder chronische Mischinfektionen.

Dosierung/Anwendung

Zur intramammären Anwendung bei Kühen. Euter gut ausmelken, Zitze reinigen, Ansatz in den Zitzenkanal einführen und Injektor ganz ausdrücken. 12 Stunden nach der ersten Behandlung und nach weiteren 12 Stunden nochmals je einen Injektor pro krankhaftes Euterviertel infundieren.

Absetzfristen

Milch und essbares Gewebe: 5 Tage

Sonstige Hinweise

Mammaneopen ist während der Laktation anzuwenden.

Medikament vor Kinderhand geschützt aufbewahren!

Bei Raumtemperatur (15 - 25°C) lagern.

Das Tierarzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit „Exp“ bezeichneten Datum verwendet werden.

Packungen

Schachteln zu 12 Injektoren und Schachteln zu 100 Injektoren

Swissmedic 45'155 (A)

ATC vet-code: QJ51RC23

Stand der Information

Oktober 2019

Zulassungsinhaberin

Werner Stricker AG

Münchenbuchsee Domizil: Zollikofen