

Westolyt-Poudre

ad us. vet.

Poudre hydrosoluble pour la réhydratation orale des veaux

Composition

Glucosum anhydricum	28,44 g
Natrii acetat anhydricus	8,2 g
Natrii chloridum	3,51 g
Kalii chloridum	1,94 g
Magnesii chloridum	0,53 g
Calcii gluconas	2,69 g
Kalii dihydrogenophosphas	3,54 g
ad pulverem pro charta 50 g	

Propriétés/Effets

A la place d'une absorption nette de liquides, une sécrétion fécale quotidienne de 2 à 4 litres survient secondairement au trouble de la sécrétion intestinale. La conséquence en est une déshydratation de l'organisme qui met souvent la vie des veaux en danger et doit être traitée le plus précocement possible. En particulier chez les veaux âgés de plus de 5 jours, la diarrhée n'est la plupart du temps plus de nature bactérienne, mais d'origine virale, de sorte que les antibiotiques et les sulfonamides n'ont largement plus aucune action. Différentes publications montrent et confirment nos propres études, à savoir que la seule administration de solutions électrolytiques permet de baisser considérablement le taux de mortalité et raccourcit fortement la période de convalescence. Afin d'obtenir une résorption maximale, la solution prête à boire doit avoir une osmolarité d'environ 300 mosml/l. La résorption optimale de la poudre Westolyt (301,5 mosml/l) dissoute dans 2 litres d'eau, est favorisée en plus par l'acétate.

Indications

Déshydratation des veaux.

Posologie/Mode d'emploi

Dissoudre le sachet de 50 g dans exactement 2 litres d'eau tiède. Par 50 kg de poids vif et pour un degré de déshydratation moyen, faire avaler le contenu d'un sachet dissous, deux à trois fois par jour, pendant 3 à 4 jours, à la place du lait ou d'autres aliments lactés.

Délais d'attente

Aucun

Remarques particulières

Ne pas mélanger directement avec du lait ou d'autres aliments lactés. Pour garantir une résorption optimale, toujours dissoudre le contenu d'un sachet dans 2 litres d'eau. Tenir hors de portée des enfants! Conserver à température ambiante (15-25°C).

Présentation

Boîte de 25 sachets à 50 g Swissmedic 45'841 (B)

ATCvet Code: QA07CQ02

Mise à jour de l'information: Juin 2003

Titulaire de l'autorisation

WERNER STRICKER SA

Münchenbuchsee

Domicile: Zollikofen