

Informazione per proprietarie e proprietari di animali

Informazione professionale destinata agli operatori può essere consultata sul sito www.tierarzneimittel.ch

1. Nome e indirizzo del titolare dell'omologazione e, se diverso, del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti

Titolare dell'omologazione e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berna

2. Denominazione del medicamento veterinario

Neo-M-Salbe forte ad us. vet., unguento in iniettori per applicazione intramammaria per vacche

3. Principi attivi ed altri ingredienti

1 iniettore da 20 g di pomata contiene:

Principi attivi:

Benzilpenicillina procaina	2 Mio. U.I.
Neomicina (sotto forma di neomicina solfato)	700 mg
Retinolpalmitato (Vitamina A)	20'000 U.I.

Eccipienti:

p-Idrossibenzoato di metile (E218)	70 mg
p-Idrossibenzoato di propile	30 mg

Unguento di colore bianco a leggermente giallastro in iniettori per applicazione intramammaria

4. Indicazioni

Preparato contro le mastiti per vacche

Per il trattamento delle mastiti durante la lattazione causate da batteri sensibili alla penicillina o alla neomicina: streptococchi, *S. agalactiae*, stafilococchi, micrococchi, *E. coli*, *Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes*

5. Controindicazioni

Non usare in caso di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

6. Effetti collaterali

Possono verificarsi reazioni allergiche (reazioni allergiche cutanee, shock anafilattico).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario.

7. Specie di destinazione

Vacca

8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

Infondere un iniettore in ogni quarto malato per tre volte a intervalli di 12 ore.

9. Avvertenze per una corretta somministrazione

Mungere accuratamente per rimuovere la maggior quantità possibile di secrezioni malate dalla mammella prima dell'infusione. Disinfettare la punta del capezzolo. Inserire l'iniettore pulito nel canale del capezzolo. Massaggiare delicatamente la mammella dopo l'infusione.

10. Tempi di attesa

Latte, tessuti commestibili: 5 giorni

11. Particolari precauzioni per la conservazione

Conservare in frigorifero (2 – 8 °C).

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata con «EXP.» sul contenitore. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

12. Avvertenze speciali

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Evitare il contatto diretto con la pelle o le mucose dell'utente a causa del rischio di sensibilizzazione.

In caso di contatto con la pelle e le mucose, lavare via il prodotto sotto l'acqua corrente.

Le persone con nota ipersensibilità alla penicillina devono evitare il contatto con il medicinale veterinario.

Gravidanza ed allattamento:

Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti, se necessario

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/o veterinaria/ veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

28.07.2023

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. Altre informazioni

3 o 100 iniettori in plastica da 20 g in scatola

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria
Swissmedic 45'983

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.