

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Panacur® Tabletten 250 ad us. vet., pour chiens et chats

Panacur® Tabletten 500 ad us. vet., pour chiens

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: MSD Animal Health GmbH, Werftstrasse 4, 6005 Lucerne

Fabricant responsable de la libération des lots: Intervet GesmbH, Siemensstrasse 107, AT - 1210 Vienne

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Panacur® Tabletten 250 ad us. vet., pour chiens et chats

Panacur® Tabletten 500 ad us. vet., pour chien

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient:

Substance active:

Fenbendazole 250 mg resp. 500 mg

Comprimé oblong blanc à gris blanc avec une ligne de sécabilité de chaque côté.

Le comprimé présente une ligne de sécabilité permettant de les couper en deux.

4. INDICATION(S)

Anthelminthique à large spectre d'action pour chiens et chats.

Infestation des chiens et des chats par les nématodes gastro-intestinaux et les ténias suivants:

les vers ronds

les ankylostomes

les trichures

les ténias

Infestation des chiots par *Giardia spp.*

5. CONTRE-INDICATIONS

Le fenbendazole n'agit pas contre les dipylidies et les echinocoques.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Le produit peut déclencher comme effets secondaires des vomissements et diarrhées faibles. Des réactions allergiques chez les chiens peuvent se produire dans de très rares cas (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés).

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien, chat

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Administration orale

Comprimé 250: 50 mg de fenbendazole/kg de poids corporel
½ comprimé (= 125 mg de fenbendazole) par 2.5 kg de poids corporel
1 comprimé (= 250 mg de fenbendazole) par 5 kg de poids corporel

Comprimé 500: 50 mg de fenbendazole/kg de poids corporel
½ comprimé (= 250 mg de fenbendazole) par 5 kg de poids corporel
1 comprimé (= 500 mg de fenbendazole) par 10 kg de poids corporel
Répéter le traitement pendant trois jours consécutifs.

Traitement des chiens et chats adultes:

Administer les comprimés soit directement, soit en les mélangeant à la nourriture après les avoir coupés en morceaux.

On peut également mettre les comprimés en suspension dans de l'eau que l'on incorpore ensuite à la nourriture.

Traitement des chiots:

Incorporer les comprimés à la nourriture après les avoir coupés en morceaux ou les avoir mis en suspension dans de l'eau.

Lorsqu'on administre les comprimés avec la nourriture, il convient de les donner dans une première partie de la ration usuelle afin d'être assuré que la dose entière soit ingérée.

Des mesures diététiques avant ou après le traitement ne sont pas nécessaires.

En cas de réinfection, le traitement doit être renouvelé.

Les comprimés de Panacur® ont un goût neutre et sont bien tolérés.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Pour l'administration orale.

10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible:

Une résistance des parasites à une classe définie d'antiparasitaires peut se développer suite à l'administration fréquente et répétée d'antiparasitaires de cette classe.

Précautions particulières d'emploi chez l'animal:

La décision d'utiliser le produit doit reposer pour chaque animal sur la confirmation de l'espèce et de la charge parasitaires ou du risque infectieux selon les données épidémiologiques.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Eviter le contact direct avec la peau. Se laver les mains après emploi.

Gestation et lactation:

Peut être utilisé chez les chiennes en gestation. Des effets tératogènes ne pouvant, dans de très rares cas, être totalement exclus chez le chien et le chat, le traitement au cours des deux premiers trimestres de la gestation doit être basé sur l'évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire traitant.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

En raison de la bonne tolérabilité du substance active, aucune mesure d'urgence n'est nécessaire.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

12.07.2022

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Présentations:

Panacur® 250: Boîte de 20 comprimés avec une ligne de sécabilité

Panacur® 500: Boîte de 20 comprimés avec une ligne de sécabilité

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 49164

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.