

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Rilexine[®] 75 ad us. vet., comprimés à mâcher sécables pour chiens et chats

Rilexine[®] 300 ad us. vet., comprimés à mâcher sécables pour chiens

Rilexine[®] 600 ad us. vet., comprimés à mâcher sécables pour chiens

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon. Domicile:

Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabricant responsable de la libération des lots: Virbac, 1^{ère} avenue, 2065 m LID, F-06516 Carros

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Rilexine 75 ad us. vet., comprimés à mâcher sécables pour chiens et chats

Rilexine 300 ad us. vet., comprimés à mâcher sécables pour chiens

Rilexine 600 ad us. vet., comprimés à mâcher sécables pour chiens

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé à mâcher contient:

Substance active:

Dosage de la comprimé à mâcher	Rilexine 75	Rilexine 300	Rilexine 600
Céfalexine	75 mg	300 mg	600 mg

Comprimé à mâcher de forme allongée, de couleur crème, avec de petites taches brunes.

Entaillé des deux côtés, divisible par deux.

4 INDICATION(S)

Antibiotique de type céphalosporine pour chiens et chats.

Traitement des maladies bactériennes causées par des germes sensibles à la céfalexine (notamment les staphylocoques).

Chiens et chats

Spécialement pour les infections

- de la peau: infections cutanées superficielles et profondes
- de l'appareil urinaire: inflammation rénales, cystites
- des voies respiratoires

Chats

En cas d'infections de la peau et du tissu sous-cutané (plaies, abcès)

5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à la substance active ou à un autre ingrédient.

Ne pas utiliser chez les lapins, hamsters, gerbilles et cobayes.

Ne pas utiliser chez les chiots et les chatons dont le poids corporel est inférieur à 1 kg.

Ne pas utiliser chez les chatons âgés de moins de 10 semaines.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de rares cas (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités), des vomissements ou des réactions allergiques ont été observés. L'administration des comprimés à mâcher avant l'alimentation permet souvent d'éviter les vomissements.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien et chats

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Pour les chiens et les chats, la dose indicative de Rilexine comprimés à mâcher est de 30 mg/kg de poids corporel/jour, répartie en 2 doses, matin et soir.

Rilexine 75	2 x 1 comprimé à mâcher par 5 kg de poids corporel
Rilexine 300	2 x 1 comprimé à mâcher par 20 kg de poids corporel
Rilexine 600	2 x 1 comprimé à mâcher par 40 kg de poids corporel

La durée du traitement dépend de la gravité des symptômes cliniques.

- Infections soudaines (aiguës): 5 – 7 jours
- Infections de longue durée (chroniques), en particulier les inflammations purulentes de la peau et les cystites chroniques: jusqu'à 30 jours

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Comme les comprimés à mâcher sont aromatisés, les chiens et les chats risquent de les rechercher de manière ciblée et de les ingérer de manière excessive. Les comprimés à mâcher Rilexine doivent donc être tenus hors de portée des animaux.

10 TEMPS D'ATTENTE

Non applicable.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver à température ambiante (entre 15 °C et 25 °C).

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible:

Afin d'éviter toute résistance aux antibiotiques, il convient d'effectuer un test de sensibilité aux agents pathogènes avant d'utiliser les comprimés à mâcher Rilexine.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:

Chez les animaux dont la fonction rénale est réduite, la posologie doit être réduite et les médicaments vétérinaires potentiellement toxiques pour les reins ne doivent pas être utilisés simultanément.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:

Les réactions allergiques à la substance active des comprimés à mâcher Rilexine (céfalexine) peuvent être graves. Les personnes présentant une hypersensibilité connue à certains antibiotiques (céphalosporines et pénicillines) doivent éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Manipulez ce médicament vétérinaire avec le plus grand soin afin d'éviter tout contact et respectez toutes les précautions recommandées. Si vous présentez des symptômes (par exemple une éruption cutanée) après avoir été en contact avec le médicament vétérinaire, consultez immédiatement un médecin en attirant son attention sur cette mise en garde. Un gonflement du visage, des lèvres ou des yeux ou des difficultés respiratoires sont des symptômes graves et nécessitent une assistance médicale urgente.

Se laver les mains après utilisation.

Gestation et lactation:

L'innocuité du médicament vétérinaire pendant la gestation et la lactation n'a pas été établie.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions:

Les comprimés à mâcher Rilexine ne doivent pas être utilisés en même temps que des antibiotiques qui inhibent la croissance des bactéries.

L'utilisation simultanée du principe actif céfalexine avec certains autres principes actifs peut entraîner des lésions rénales. Informez donc votre vétérinaire si vous administrez d'autres médicaments à votre animal, même ceux que vous avez achetés vous-même.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

Des études ont montré que le médicament vétérinaire est bien toléré en cas de surdosage jusqu'à 5 fois.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

07.03.2024

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Rilexine 75 comprimés à mâcher / Rilexine 300 comprimés à mâcher / Rilexine 600 comprimés à mâcher: boîte pliante avec 14 ou 140 comprimés.

Blister (plastique-aluminium) de 7 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 51'655

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché désigné à la rubrique 1.