

INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Rilexine® 75 ad us. vet., compresse masticabili divisibili per cani e gatti

Rilexine® 300 ad us. vet., compresse masticabili divisibili per cani

Rilexine® 600 ad us. vet., compresse masticabili divisibili per cani

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon. Domicilio: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Virbac, 1^{ère} avenue, 2065 m LID, F-06516 Carros

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Rilexine 75 ad us. vet., compresse masticabili divisibili per cani e gatti

Rilexine 300 ad us. vet., compresse masticabili divisibili per cani

Rilexine 600 ad us. vet., compresse masticabili divisibili per cani

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa masticabile contiene:

Principio attivo:

Dosaggio della compressa masticabile	Rilexine 75	Rilexine 300	Rilexine 600
Cefalexina	75 mg	300 mg	600 mg

Compressa masticabile allungata di colore crema con piccole macchie marroni. Intagliata su entrambi i lati, può essere dimezzata.

4 INDICAZIONE(I)

Antibiotico cefalosporinico per cani e gatti

Terapia delle malattie batteriche causate da germi sensibili alla cefalexina (soprattutto stafilococchi).

Cani e gatti

Soprattutto per le infezioni:

- della pelle: infezioni cutanee purulente superficiali e profonde
- del sistema urinario: infezioni renali, infezioni della vesica
- delle vie respiratorie

Gatti

Per le infezioni della pelle e del tessuto sottocutaneo (ferite, ascessi)

5 CONTROINDICAZIONI

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o a un eccipiente.

Non utilizzare su conigli, criceti, gerbilli e porcellini d'India.

Non utilizzare in cuccioli e gattini di peso corporeo inferiore a 1 kg.

Non utilizzare in gattini di età inferiore alle 10 settimane.

6 EFFETTI COLLATERALI

In rari casi (più di 1 ma meno di 10 su 10.000 animali trattati) sono stati osservati vomito o reazioni allergiche. Spesso il vomito può essere evitato somministrando le compresse masticabili prima del pasto.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per cani e gatti, la dose raccomandata di Rilexine compresse masticabili è di 30 mg/kg di peso corporeo al giorno, suddivisa in 2 dosi, mattina e sera.

Rilexine 75	2 x 1 compressa masticabile per 5 kg di peso corporeo
Rilexine 300	2 x 1 compressa masticabile per 20 kg di peso corporeo
Rilexine 600	2 x 1 compressa masticabile per 40 kg di peso corporeo

La durata della terapia dipende dalla gravità dei sintomi clinici.

- Insorgenza improvvisa di infezioni (infezioni acute): 5 – 7 giorni
- Infezioni di lunga durata (infezioni croniche), soprattutto infiammazioni cutanee purulente e cistiti croniche: fino a 30 giorni

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Poiché le compresse masticabili sono aromatizzate, vi è il rischio che cani e gatti le cerchino e le ingeriscano in eccesso. Le compresse masticabili di Rilexine devono quindi essere tenute fuori dalla portata degli animali.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente (15 °C – 25 °C).

Conservare il medicamento veterinario fuori dalla portata dei bambini.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sul contenitore con la dicitura «EXP».

12 AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Per evitare la resistenza agli antibiotici, prima di utilizzare Rilexine compresse masticabili è necessario eseguire un test di sensibilità agli agenti patogeni.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Negli animali con funzionalità renale compromessa, il dosaggio deve essere ridotto e non devono essere somministrati contemporaneamente medicinali veterinari potenzialmente dannosi per i reni.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Le reazioni allergiche al principio attivo di Rilexine compresse masticabili (cefalexina) possono essere gravi. Le persone con ipersensibilità nota ad alcuni antibiotici (cefalosporine e penicilline) devono evitare il contatto con il medicamento veterinario. Maneggiare questo medicamento veterinario con grande attenzione per evitare il contatto e osservare tutte le precauzioni raccomandate. In caso di comparsa di sintomi (ad es. eruzione cutanea) dopo il contatto con il medicamento veterinario, consultare immediatamente un medico e fare riferimento a questa avvertenza. Gonfiore del viso, delle labbra o degli occhi o difficoltà respiratorie sono sintomi gravi e richiedono un intervento medico urgente.

Lavarsi le mani dopo l'utilizzo.

Gravidanza e allattamento:

L'innocuità del medicamento veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata dimostrata.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

Rilexine compresse masticabili non deve essere usato contemporaneamente ad antibiotici che inibiscono la crescita batterica.

L'uso contemporaneo del principio attivo Cefalexina con alcuni altri principi attivi può causare danni ai reni. È quindi necessario informare il veterinario se si somministrano al proprio animale altri farmaci, compresi quelli acquistati personalmente.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Gli studi hanno dimostrato che il medicamento veterinario è ben tollerato fino a un sovradosaggio di 5 volte.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/a veterinaria/ veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

07.03.2024

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Rilexine 75 compresse masticabile / Rilexine 300 compresse masticabile / Rilexine 600 compresse masticabile: scatola pieghevole con 14 o 140 compresse

Blister (plastica-alluminio) contenente 7 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 51'655

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella rubrica 1.