

INFORMATION FÜR TIERHALTERINNEN UND TIERHALTER
Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.tierarzneimittel.ch

PACKUNGSBEILAGE

exspot® ad us. vet., Lösung zum Auftragen auf die Haut für Hunde

**1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN UND, WENN
UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE
VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber: MSD Animal Health GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern
Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin: Intervet Productions s.r.l. Via Nettunense
Km.20,300; IT-04011 Aprilia (LT)

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

exspot® ad us. vet., Lösung zum Auftragen auf die Haut für Hunde

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:

Wirkstoff:

Permethrin 715 mg

Lösung zum Auftragen auf die Haut
Klare, gelbe bis leicht braune Lösung

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Bekämpfung (abweisende und vorbeugende Wirkung und Behandlung) von Flöhen und zur
Behandlung von Zecken (braune Hundezecke, Holzbock).
Zur Bekämpfung (Stich wird verhindert und Abtötung) von Schmetterlingsmücken.

Eine einmalige Anwendung tötet Flöhe und Zecken ab und schützt vor erneutem Befall mit Flöhen
und Zecken über einen Zeitraum von zwei Wochen bis vier Wochen.

Der 'anti-feeding-effect' (Stich wird verhindert) und die abtötende Wirkung gegen
Schmetterlingsmücken hält für mindestens 2 Wochen an.

Zur Beachtung: Das Anhaften einzelner Zecken kann nicht ausgeschlossen werden.

5. GEGENANZEIGEN



Nicht bei Katzen anwenden!

Permethrin ist ausserordentlich giftig für Katzen. exspot® darf auf keinen Fall, auch nicht in geringen Mengen, bei Katzen angewendet werden. Katzen können die in exspot® enthaltene Menge Permethrin in ihrem Stoffwechsel nicht verarbeiten.

Um einen versehentlichen Kontakt mit exspot® zu verhindern, sind Katzen von behandelten Hunden fernzuhalten, bis die Stelle des aufgetragenen Medikaments getrocknet ist. Es ist sicherzustellen, dass Katzen behandelte Hunde nicht an der Applikationsstelle ablecken. Lebensbedrohliche Vergiftungserscheinungen können die Folge sein, die mit Symptomen wie starken Muskelkrämpfen und Bewegungsstörungen einhergehen und zum Tod der Katze führen können.

Als erste Massnahme sollte ein Abwaschen und Baden der Katze mit einem milden Reinigungsshampoo oder Geschirrspülmittel erfolgen. Der Patient sollte danach unverzüglich einer Tierärztin/einem Tierarzt vorgestellt werden.

Nicht bei unter 2 Wochen alten Welpen anwenden.

Nicht bei kranken Tieren anwenden oder solchen, die sich gerade von einer Krankheit erholen.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder dem sonstigen Bestandteil.

6. NEBENWIRKUNGEN

In seltenen (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10 000 behandelten Tieren) Fällen kann es an der Auftragsstelle zu lokalen Überempfindlichkeitsreaktionen wie Rötungen, Juckreiz, Haarausfall und Blasenbildung kommen. Häufige Symptome (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren) umfassen Appetitverlust, Erbrechen, Müdigkeit, Erregung, Zittern, Muskelkrämpfe, Lähmungen und/oder Ataxie. Diese unerwünschten Wirkungen sind in der Regel vorübergehend und verschwinden innerhalb einiger Stunden nachdem der Hund mit Wasser und Shampoo gewaschen wurde. In gravierenderen Fällen ist die Tierärztin/der Tierarzt aufzusuchen.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin/Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin/Ihrem Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)





Hund

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zum direkten Auftragen auf die Haut

- Hunde von 2.5 kg bis 6.5 kg KGW: 0.5 ml (1/2 Pipette)

- Hunde von 6.5 kg bis 15 kg KGW: 1 ml (1 Pipette)
- Hunde von 15 kg bis 29 kg KGW: 2 ml (2 Pipetten)
- Hunde ab 30 kg KGW und darüber: 3 ml (3 Pipetten)

				
Gewicht des Hundes (kg)	2.5 - 6.5 kg	6.5 - 15 kg	15 - 29 kg	> 30 kg
Menge an Produkt	0.5 ml	1 ml	2 ml	3 ml
Applikationsort	0.5 ml (1/2 Pipette) zwischen die Schulterblätter	1 ml (1 Pipette) zwischen die Schulterblätter	1 ml (1 Pipette) zwischen die Schulterblätter und 1 ml (1 Pipette) im Schwanzwurzelbereich	1 ml (1 Pipette) zwischen die Schulterblätter, 1 ml (1 Pipette) im Schwanzwurzelbereich und 1 ml (1 Pipette) in der Mitte des Rückens
Permethrin (mg/kg KGW)	143 mg/kg KGW bis 55 mg/kg KGW bei Hunden von 2.5 bis 6.5 kg	110 mg/kg KGW bis 48 mg/kg KGW bei Hunden von 6.5 bis 15 kg	95 mg/kg KGW bis 49 mg/kg KGW bei Hunden von 15 bis 29 kg	Von 72 mg/kg KGW bei Hunden mit 30 kg abnehmend mit zunehmendem Körpergewicht

Das Fell auseinander teilen und die entsprechende Menge des Tierarzneimittels direkt auf die Haut zwischen den Schulterblättern bzw. im Schwanzwurzelbereich bzw. in der Mitte des Rückens auftragen.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Art der Anwendung

Nur zum Auftropfen auf die Haut.

Die Umverpackung öffnen und die Pipette entnehmen.



1. Schritt: Der Hund sollte für eine einfachere Handhabung stehen. Mit einer Hand die Pipette aufrecht, aber nicht in Richtung des eigenen Gesichtes halten. Mit der anderen Hand die Spitze durch Hin- und Herbiegen abbrechen.



2. Schritt: Das Fell auf dem Rücken des Hundes im Bereich zwischen den Schulterblättern scheiteln, bis die Haut sichtbar wird und die Pipettenspitze auf die Haut setzen. Die Pipette kräftig ausdrücken, um den gesamten Inhalt der Pipette auf die Haut aufzutragen.

Bei grösseren Hunden sollten 2-3 Pipetten nach Dosierungstabelle verwendet werden.

Hunde, die mehrfach heftigen Regenfällen ausgesetzt oder oft im Wasser waren, sollten erneut behandelt werden.

Das erneute Auftragen des Produktes ist in diesen Fällen nach frühestens 7 Tagen möglich.

Mit exspot® behandelte Hunde sollten nicht mit fettlöslichen Shampoos gereinigt werden.

Um einen erneuten Befall mit Flöhen und Zecken zu vermeiden, soll das Lager der Tiere und die direkte Umgebung mit geeigneten Mitteln behandelt werden.

10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25°C lagern. Trocken lagern.

Vor Licht schützen. Nicht einfrieren.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Hunde mit Wunden, besonders im Rückenbereich, sind von der Behandlung auszuschliessen.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Dieses Tierarzneimittel ist nur für den äusserlichen Gebrauch vorgesehen.

Es soll verhindert werden, dass sich das Tier an der Applikationsstelle ableckt.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwenderin / den Anwender:

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Hände nach der Anwendung waschen.

Falls exspot® versehentlich in die Augen gelangt ist, diese gründlich mit Wasser ausspülen.

Verschüttete Flüssigkeit sofort auswaschen.

Bei der Anwendung von exspot® nicht essen, trinken oder rauchen.

Für die Dauer von 3-6 Stunden nach Anwendung ist der Kontakt mit der behandelten Hautoberfläche zu vermeiden. Eine Behandlung der Tiere am Abend wird daher empfohlen. Kürzlich behandelte Hunde sollten nicht mit der Besitzerin/dem Besitzer in einem Bett schlafen, insbesondere nicht mit Kindern.

Personen, die das Produkt häufig anwenden, zum Beispiel in Hundezwingern, sollten Schutzhandschuhe aus Neopren oder Nitril mit einer minimalen Stärke von 3 mm verwenden.

Trächtigkeit und Laktation:

Studien an Labortieren zeigen, dass weder Permethrin noch der Trägerstoff Missbildungen fördert. Untersuchungen mit Permethrin an trächtigen Hündinnen zeigten keine nachteiligen Auswirkungen weder auf die Welpen noch auf die Muttertiere. Mit dem vorliegenden Tierarzneimittel wurden keine Untersuchungen bezüglich Anwendung in der Trächtigkeit oder Säugeperiode durchgeführt. Die Sicherheit der Anwendung des Produktes bei trächtigen oder laktierenden Hunden wurde nicht untersucht.

Trächtige Hündinnen sollen einige Zeit vor dem Geburtstermin behandelt werden, um den Kontakt neugeborener Welpen gegenüber dem Produkt zu minimieren.

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Angaben betreffend Überdosierung bei der Katze siehe unter 5. Gegenanzeige.

Umweltverträglichkeit

Gefährlich für Fische, Wasserlebewesen und Bienen! exspot® darf nicht in der Nähe von Aquarien, Fischbecken u.ä. angewendet werden.

Behandelte Tiere dürfen für mindestens 24 Stunden nach der Anwendung nicht in Kontakt mit Oberflächengewässern kommen.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihre Tierärztin/Ihren Tierarzt oder Ihre Apothekerin/Ihren Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz. Restmengen in angebrochenen Packungen entsorgen.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

05.06.2023

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Packungen: Schachtel mit 6 x 1 ml Pipette
Schachtel à 6 Schachteln mit 6 x 1 ml Pipette
Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 51793

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.