

Ilcocillin™ P300 ad us. vet.

Antibiotikum für Rinder. Schafe. Schweine, Hunde und Katzen

Zusammensetzung

Wirkstoff: Benzylpenicillinum procainum 300 000 U.I. (entsprechend 300 mg), Lecithinum, Polyvidonum K 12, Natrii edetas, Natrii citras, Kalii dihydrogenophosphas. Polysorbatum 80, Simethiconum, Conserv.: E 215, E 217, E 219 1,5 mg, Aqua ad iniectabilia q.s. ad suspensionem pro 1 ml.

Wässrige Injektionssuspension

Eigenschaften/Wirkungen

Ilcocillin P300 ist ein Antibiotikum gegen grampositive Infektionserreger. Es wirkt insbesondere gegen Streptokokken nicht B-Laktamase produzierende Staphylokokken, Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria, Pasteurella haemolytica. Pasteurella multocida. Penicillin G ist das wirksamste der bekannten Penicilline. Als Procain-Komplexverbindung wird es langsam resorbiert und unterhält dadurch lange einen therapeutisch wirksamen Blutspiegel.

Pharmakokinetik

Benzylpenicillin wird nach i.m. Injektion gut resorbiert. Wirksame Plasmakonzentrationen werden bereits 1—3 Std. nach i.m. Injektion erreicht.

Die Halbwertszeit beträgt bei Schweinen und Schafen 2—3 Stunden, bei Rindern 5—6 Stunden.

Indikationen

Akute und chronische Infektionen mit Penicillin-empfindlichen Bakterien; Schweinerotlauf, Druse im Anfangsstadium, Anthrax.

Dosierung/Anwendung

Rind, Schwein, Schaf	1 ml/30 kg (entspr. 10'000 U.I. / kg)
Hund. Katze. Ferkel (unter 10 kg)	0.2 ml / 3 kg (entspr. 20'000 U.I. / kg)

Ilcocillin P300 intramuskulär injizieren, einmal täglich während 5 Tagen.

Anwendungseinschränkungen

a) *Kontraindikationen*: Bekannte Überempfindlichkeit gegen Penicillin oder Procain.

b) *Vorsichtsmassnahmen*: Bei Tieren mit Niereninsuffizienz ist Penicillin mit Vorsicht anzuwenden.

Unerwünschte Wirkungen

Allergische Reaktionen (allergische Hautreaktionen, Anaphylaxie).

Absetzfristen

Fleisch: 5 Tage. Milch: 3 Tage

Wechselwirkungen

Keine bekannt.

Sonstige Hinweise

Bei Kühlschranktemperatur (2—8°C) lagern und vor Licht schützen.

Mach Entnahme der ersten Dosis innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.

Tierarzneimittel, für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Packungen

Schachteln mit 10 Flaschen zu 100 ml

Swissmedic 52704 (B)
ATCvet-Code QJ01CE09

Zulassungsinhaberin
Biokema SA, Crissier

Stand der Information
August 2014