

**Information destinée aux détenteurs d'animaux**

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

**NOTICE D'EMBALLAGE**

FRONTLINE® ad us.vet., spray pour chiens et chats

**1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Bâle

Fabricant responsable de la libération des lots:

Boehringer Ingelheim Animal Health France, 4 ch. du Calquet, F-31000 Toulouse

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FRONTLINE® ad us.vet., spray pour chiens et chats

**3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)**

**Substance active:**

1 ml solution contient: Fipronil 2,5 mg

**4. INDICATION(S)**

Affections dues à des parasites sensibles au fipronil chez les chiens et chats:

- Prévention et traitement des infestations par les puces et les tiques.
- Élimination des poux broyeur.

La durée de protection contre les nouvelles infestations par les puces varie de 60 à 90 jours chez le chien et est d'environ 40 jours chez le chat. La durée de protection contre les nouvelles infestations par les tiques est d'environ 30 jours chez le chien et de 2 semaines chez le chat.

Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP).

**5. CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre...) ou convalescents.

En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg.

Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue aux principes actifs, ou à l'un des excipients.

## **6. EFFETS INDÉSIRABLES**

En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation due à la nature de l'excipient peut être observée. Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires, érythème, prurit ou alopecie ont été rapportés après utilisation. Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux), des vomissements et des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation. Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

## **7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)**

Chien et chat

## **8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**

Afin de bien mouiller le pelage, et en fonction de la longueur des poils, appliquer 3-6 ml par kg (7,5 à 15 mg de principe actif par kg), soit:

Flacon de 100 ml: 6-12 pressions de la pompe par kg de poids corporel.

Flacon de 250 ml: 2-4 pressions de la pompe par kg de poids corporel.

## **9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

Pulvériser sur toute la surface du corps, en maintenant le flacon à une distance de 10-20 cm.

Appliquer à rebrousse-poil en ayant soin de couvrir la totalité de l'animal, afin de mouiller uniformément le pelage. Après l'application, frictionner à l'aide d'un chiffon propre ou de la main protégée pour faire pénétrer le produit jusqu'à la peau. Laisser sécher sans essuyer. En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

## **10. TEMPS D'ATTENTE**

Sans objet.

## **11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 30°C).

Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur l'emballage avec la mention «EXP».

## **12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:

Il est important de veiller à ce que les animaux ne se lèchent pas entre eux.

Les animaux ne doivent pas être autorisés à nager dans les cours d'eau pendant les 2 jours suivant l'application.

Les bains et les immersions dans l'eau dans les 2 jours précédant et suivant l'application du produit doivent être évités.

Des tiques attachées peuvent occasionnellement être observées aussi chez les animaux traités. Pour cette raison, la transmission des maladies infectieuses ne peut pas être complètement exclue si les conditions sont défavorables.

Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. Il faut donc éviter le contact du produit avec la bouche, le nez et les yeux. Ne pas pulvériser dans les yeux ou le nez ou sur les plaies cutanées.

Les puces des animaux de compagnie infestent souvent leur panier, leur zone de couchage et leurs zones de repos habituelles comme les tapis et les canapés. En cas d'infestation massive, au début de traitement, ces endroits devront être traités avec un insecticide adapté et aspirés régulièrement.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:

Les animaux ou les utilisateurs ayant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool devraient éviter le contact avec le médicament.

Comme pour tous les insecticides, il est recommandé de porter des gants et de traiter les animaux dans un local bien aéré.

Eviter le contact du contenu avec les doigts.

Se laver les mains avec de l'eau et du savon après chaque utilisation.

En cas d'exposition accidentelle des yeux, rincer à l'eau pure avec soin.

Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le pelage soit sec.

Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée.

Les animaux récemment traités ne devraient pas être autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

Fipronil peut nuire aux organismes aquatiques. Ne pas contaminer les étangs, les rivières ou les ruisseaux avec le médicament ou les emballages vides.

Ne pas vaporiser en direction d'une flamme ou d'un corps incandescent.

Ne pas exposer l'animal traité à une flamme ou à une autre source de chaleur avant qu'il soit complètement sec.

Gestation et lactation:

FRONTLINE® SPRAY peut être utilisé pendant la gestation et la lactation.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

Le risque de provoquer des effets secondaires peut augmenter dans le cas de surdosage. Les conséquences éventuelles devront faire l'objet d'un traitement symptomatique.

**13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Fipronil peut nuire aux organismes aquatiques. Ne pas contaminer les étangs, les rivières ou les ruisseaux avec le médicament ou les emballages vides.

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

**14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE**

24.07.2020

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) et [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

**15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

Flacons de 100 ml et 250 ml.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise D: remise en ordonnance sur conseil spécialisé

Swissmedic 53'004

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.