

INFORMATION FÜR TIERHALTERINNEN UND TIERHALTER

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.tierarzneimittel.ch

PACKUNGSBEILAGE

Cestex® 12.5 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde und Katzen

Cestex® 25 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde und Katzen

Cestex® 100 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde

1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSHABERIN UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaberin: Zoetis Schweiz GmbH
Rue de la Jeunesse 2
2800 Delémont

Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin: Zoetis LLC
601 W. Cornhusker Highway
Lincoln, NE, 68521, USA

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Cestex® 12.5 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde und Katzen

Cestex® 25 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde und Katzen

Cestex® 100 mg ad us. vet., Filmtabletten für Hunde

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Filmtablette enthält:

Wirkstoff:

Epsiprantel 12.5 mg, 25 mg oder 100 mg.

Darreichungsform:

12.5 mg: eine rote, runde, bikonvexe Filmtablette mit der Prägung „219“

25 mg: eine braune, runde, bikonvexe Filmtablette mit der Prägung „220“

100 mg: eine pfirsichfarbene, runde, bikonvexe Filmtablette mit der Prägung „222“

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Bandwurmmittel für Hunde und Katzen.

Behandlung des Befalls mit Bandwürmern bei Katzen und Hunden:

- Katze: Gurkenkernbandwurm (*Dipylidium caninum*), Rinderbandwurm (*Taenia spp.*), Fuchsbandwurm (*Echinococcus multilocularis*)
- Hund: Gurkenkernbandwurm (*Dipylidium caninum*), Rinderbandwurm (*Taenia spp.*), Hundebandwurm (*Echinococcus granulosus*), Fuchsbandwurm (*Echinococcus multilocularis*).

5. GEGENANZEIGEN

Nicht an Tiere verabreichen, die jünger als sieben Wochen oder trächtig sind (siehe auch Rubrik 12).

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin / Ihrem Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Hunde und Katzen.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Katze: 2.75 mg/kg Körpergewicht (KGW).

- 1 Tablette 12.5 mg für Katzen bis 4.5 kg KGW.
- 1 Tablette 25 mg für Katzen von 4.5 bis 9 kg KGW.

Hund: 5.5 mg/kg Körpergewicht (KGW).

- 1 Tablette 12.5 mg für Hunde bis 2.3 kg KGW.
- 1 Tablette 25 mg für Hunde bis 4.5 kg KGW.
- 1 Tablette 100 mg für Hunde von 9 bis 18 kg KGW.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Die Tabletten werden einmalig über das Maul verabreicht.

Fasten ist weder erforderlich noch empfohlen.

Die Therapie eines gesicherten Fuchsbandwurmträgers (*Echinococcus multilocularis*) sollte wegen des Infektionsrisikos für den Menschen nur unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen in einer Klinik vorgenommen werden (siehe auch Rubrik 12). Aus Sicherheitsgründen sollten die Hunde an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit Cestex® behandelt werden. Die betroffenen Räumlichkeiten sind hinterher zu reinigen und zu desinfizieren. Zur Vorbeugung des Fuchsbandwurmes bei mausenden Hunden und Katzen wird eine monatliche Behandlung mit Cestex® empfohlen.

10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Trocken und bei Raumtemperatur (15 – 25°C) lagern.

Tierarzneimittel ausser Reichweite von Kindern aufbewahren!

Das Präparat darf nur bis zu dem auf der Packung mit «Exp» gekennzeichneten Datum verwendet werden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Keine.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Eine Wiederbesiedlung mit Bandwürmern ist bei erneuter Exposition mit den Zwischenwirten der Bandwürmer wahrscheinlich. Besonders beim Befall mit Gurkenkernbandwurm (*Dipylidium caninum*) ist darum für ein wirksames Flohbekämpfungsprogramm zu sorgen.

Die Therapie eines gesicherten Fuchsbandwurmträgers (*Echinococcus multilocularis*) sollte wegen des Infektionsrisikos für den Menschen nur unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen in einer Klinik vorgenommen werden (siehe auch Rubrik 9).

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwenderin/ den Anwender:

Nicht zutreffend.

Trächtigkeit:

Nicht an Tiere verabreichen, die jünger als sieben Wochen oder trächtig sind (siehe auch Rubrik 5).

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Die 90-fache therapeutische Dosis (500 mg/kg Körpergewicht (KGW)) während 14 Tagen führte bei Hunden lediglich vereinzelt zu Erbrechen.

Katzen wurden bis 36-fache therapeutische Dosen an bis zu vier Tagen verabreicht. Vereinzelt trat kurzfristig Erbrechen auf.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihre Tierärztin / Ihren Tierarzt oder Ihre Apothekerin / Ihren Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

11.11.2021

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Cestex® 12.5 mg: Polyethylenflasche mit 50 Filmtabletten

Cestex® 25 mg: Polyethylenflasche mit 50 Filmtabletten

Cestex® 100 mg: Polyethylenflasche mit 50 Filmtabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 53487

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der in der Rubrik 1 genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.