

## **INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI**

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### **FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

Cestex® 12.5 mg ad us. vet., compresse rivestite con film per cani e gatti

Cestex® 25 mg ad us. vet., compresse rivestite con film per cani e gatti

Cestex® 100 mg ad us. vet., compresse rivestite con film per cani

### **1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI**

Titolare dell'omologazione: Zoetis Schweiz GmbH  
Rue de la Jeunesse 2  
2800 Delémont

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Zoetis LLC  
601 W. Cornhusker Highway  
Lincoln, NE, 68521, USA

### **2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Cestex® 12.5 mg ad us. vet., compresse rivestite con film per cani e gatti

Cestex® 25 mg ad us. vet., compresse rivestite con film per cani e gatti

Cestex® 100 mg ad us. vet., compresse rivestite con film per cani

### **3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI**

1 compressa rivestita con film contiene:

#### **Principio attivo:**

Epsiprantel 12.5 mg, 25 mg o 100 mg.

#### **Forma farmaceutica:**

12.5 mg: compressa rivestita con film rossa, rotonda, biconvessa, con impresso "219"

25 mg: compressa rivestita con film marrone, rotonda, biconvessa, con impresso "220"

100 mg: compressa rivestita con film color pesca, rotonda, biconvessa, con impresso "222"

#### **4. INDICAZIONE(I)**

Antielmintico tenicida per cani e gatti.

Trattamento delle infestazioni da cestodi nel cane e nel gatto:

- Gatto: tenia cetriolo (*Dipylidium caninum*), tenia dei bovini (*Taenia spp.*), tenia della volpe (*Echinococcus multilocularis*)
- Cane: tenia cetriolo (*Dipylidium caninum*), tenia dei bovini (*Taenia spp.*), tenia del cane (*Echinococcus granulosus*), tenia della volpe (*Echinococcus multilocularis*).

#### **5. CONTROINDICAZIONI**

Non somministrare agli animali di età inferiore alle sette settimane o in gravidanza (cfr. anche la rubrica 12).

#### **6. EFFETTI COLLATERALI**

Non noti.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/ il veterinario o la/il farmacista.

#### **7. SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cani e gatti.

#### **8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Gatto: 2.75 mg/kg di peso corporeo (PC).

- 1 compressa da 12.5 mg per gatti fino a 4.5 kg di PC.
- 1 compressa da 25 mg per gatti da 4.5 a 9 kg di PC.

Cane: 5,5 mg/kg di peso corporeo (PC).

- 1 compressa da 12.5 mg per cani fino a 2.3 kg di PC.
- 1 compressa da 25 mg per cani fino a 4.5 kg di PC.
- 1 compressa da 100 mg per cani da 9 a 18 kg di PC.

#### **9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Le compresse vengono somministrate una volta, per via orale.

Il digiuno non è necessario né raccomandato.

**La terapia di un portatore confermato di tenia della volpe (*Echinococcus multilocularis*) deve essere effettuata solo in una clinica, con speciali precauzioni di sicurezza, a causa del rischio di infezione per l'uomo** (cfr. anche la rubrica 12). Per ragioni di sicurezza, i cani devono essere trattati con Cestex® in due giorni consecutivi. I locali interessati devono essere poi puliti e disinfezati. Per la prevenzione della tenia della volpe in cani e gatti in libertà, si raccomanda un trattamento mensile con Cestex®.

## **10. TEMPO(I) DI ATTESA**

Non pertinente.

## **11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Il preparato non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «Exp» sul contenitore.

## **12. AVVERTENZE SPECIALI**

### ***Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:***

Nessuna.

### ***Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:***

La reinfestazione da cestodi è probabile se l'animale è nuovamente esposto agli ospiti intermedi della tenia. Pertanto, soprattutto nei casi di infestazione da tenia cetriolo (*Dipylidium caninum*), va garantito un efficace programma di controllo delle pulci.

**La terapia di un portatore confermato di tenia della volpe (*Echinococcus multilocularis*) deve essere effettuata solo in una clinica, con speciali precauzioni di sicurezza, a causa del rischio di infezione per l'uomo** (cfr. anche la rubrica 9).

### ***Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:***

Non pertinente.

### ***Gravidanza:***

Non somministrare negli animali di età inferiore alle sette settimane o in gravidanza (cfr. anche la rubrica 5).

**Interazione con altri medicamenti e altre forme d'interazione:**

Non note.

**Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):**

Una dose pari a 90 volte quella terapeutica (500 mg/kg di peso corporeo (PC)) per 14 giorni ha causato solo occasionalmente vomito nei cani.

Nel gatto è stata somministrata una dose fino a 36 volte quella terapeutica per un massimo di quattro giorni. È comparso occasionalmente vomito di breve durata.

**13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicamenti non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/ al propria/o veterinaria/ veterinario o alla/ al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicamenti di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

**14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

15.05.2025

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e su [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

**15. ALTRE INFORMAZIONI**

Cestex® 12.5 mg: flacone in polietilene da 50 compresse rivestite con film

Cestex® 25 mg: flacone in polietilene da 50 compresse rivestite con film

Cestex® 100 mg: flacone in polietilene da 50 compresse rivestite con film

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 53487

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella rubrica 1.