

Frontline® Spot On Chien S ad us. vet., solution

Frontline® Spot On Chien M ad us. vet., solution

Frontline® Spot On Chien L ad us. vet., solution

Frontline® Spot On Chien XL ad us. vet., solution

Solution insecticide et acaricide cutanée pour dépôt

COMPOSITION

Frontline Spot On Chien S:

Fipronilum: 67 mg

Antiox.: E 320, E 321

Excipients q.s. pro vase: 0,67 ml

Frontline Spot On Chien M:

Fipronilum: 134 mg

Antiox.: E 320, E 321

Excipients q.s. pro vase: 1,34 ml

Frontline Spot On Chien L:

Fipronilum: 268 mg

Antiox.: E 320, E 321

Excipients q.s. pro vase: 2,68 ml

Frontline Spot On Chien XL:

Fipronilum: 402 mg

Antiox.: E 320, E 321

Excipients q.s. pro vase: 4,02 ml

PROPRIÉTÉS / EFFETS

Le fipronil est un insecticide/acaricide appartenant à la famille des phénylpyrazolés. Il agit en inhibant le complexe GABA, bloquant ainsi le transfert des ions chlore au travers de la membrane aux niveaux pré et post-synaptiques en se fixant dans le canal chlore. Il provoque ainsi une activité incontrôlée du système nerveux central et la mort des insectes et des acariens.

Après application, il s'établit sur le pelage de l'animal un gradient de concentration de fipronil, à partir du point d'application vers les zones périphériques (zones lombaires, flancs...). Au cours du temps, les concentrations de fipronil sur les poils vont en décroissant pour atteindre une concentration moyenne d'environ 3 à 4 µg/g de poil, 56 jours après le traitement. Cette rémanence prolongée du fipronil sur le poil s'explique par l'accumulation du fipronil dans les glandes sébacées et son relargage progressif conjointement avec le sébum.

Chez le chien, le passage transcutané du fipronil est faible. Le fipronil est métabolisé en son dérivé sulfone.

INDICATIONS

Affections à parasites sensibles au fipronil chez le chien:

- Traitement curatif et préventif des infestations par les puces et par les tiques
- Elimination des poux broyeurs

La durée de protection contre les nouvelles infestations est de 2 mois pour les puces et d'un mois pour les tiques.

Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP).

POSOLOGIE / MODE D'EMPLOI

- 1 pipette de 0,67 ml pour un chien pesant de 2 à 10 kg,
- 1 pipette de 1,34 ml pour un chien pesant plus de 10 kg jusqu' à 20 kg,
- 1 pipette de 2,68 ml pour un chien pesant plus de 20 kg jusqu' à 40 kg,
- 1 pipette de 4,02 ml pour un chien pesant plus de 40 kg jusqu' à 60 kg.

Pour les chiens de plus de 60 kg:

- 1 pipette de 4,02 ml et 1 pipette appropriée de moindre volume.

Usage externe, administration cutanée.

En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines. Casser l'embout de la pipette au niveau de la partie prédécoupée. Vider complètement la pipette entre les omoplates, directement sur la peau, en écartant les poils de l'animal, pour éviter le léchage.

Frontline Spot-On Chien peut être utilisé pendant la gestation et la lactation.

LIMITATIONS D'EMPLOI

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre...) ou convalescents.

Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. Ce produit a été spécialement développé pour les chiens. Ne pas utiliser chez les chats car cela peut conduire à un surdosage.

En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots âgés de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg.

Précautions

Ne pas surdoser. Le risque de provoquer des effets secondaires peut augmenter avec le surdosage. Il est donc recommandé de toujours traiter les animaux avec la taille de pipette appropriée.

Il est important de veiller à appliquer le produit sur une zone où l'animal ne peut pas se lécher et de veiller à ce que les animaux ne se lèchent pas entre eux.

Les bains/immersions dans l'eau dans les 2 jours suivant l'application du produit et des bains plus fréquents qu'une fois par semaine doivent être évités en l'absence d'étude d'efficacité à ce sujet.

Les shampooings émoullissants peuvent être utilisés avant le traitement, mais diminuent la durée de protection contre les puces à environ 5 semaines lorsqu'ils sont utilisés une fois par semaine après application du produit. Les bains hebdomadaires avec des shampooings à 2 % de chlorhexidine n'ont pas diminué l'efficacité du produit contre les puces dans une étude de 6 semaines.

Les chiens ne doivent pas être autorisés à nager dans les cours d'eau pendant les 2 jours suivant l'application.

Des tiques attachées peuvent occasionnellement être observées aussi chez les animaux traités. Pour cette raison, la transmission de maladies infectieuses ne peut pas être complètement exclue si les conditions sont défavorables.

EFFETS INDÉSIRABLES

En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation principalement due à la nature de l'excipient peut être observée.

Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, alopecie locale, prurit, érythème) ainsi que du prurit général ou une alopecie générale ont été rapportés.

Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux), des vomissements ou des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation.

INTERACTIONS

Non connues.

REMARQUES PARTICULIÈRES

Les puces des animaux de compagnie infestent souvent leur panier, leur zone de couchage et leurs zones de repos habituelles comme les tapis et les canapés. En cas d'infestation massive, au début de traitement, ces endroits devront par conséquent être traités avec un insecticide adapté et aspirés régulièrement.

Eviter le contact avec les yeux de l'animal.

Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. Donc éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux.

Les animaux ou les utilisateurs ayant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool devraient éviter le contact avec le médicament.

Eviter le contact du contenu avec les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon.

En cas d'exposition accidentelle avec les yeux, rincer à l'eau pure avec soin.

Se laver les mains après utilisation.

Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

Le fipronil peut nuire aux organismes aquatiques. Ne pas jeter le produit ou les emballages vides dans les étangs, les rivières et les ruisseaux.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas conserver au-dessus de 25 °C.

Conserver dans l'emballage extérieur et à l'abri de l'humidité.

PRÉSENTATION

Pipettes de: 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml, et 4,02 ml en emballages de 3 pipettes.

Swissmedic No. 53'840 (D)
ATCvet-Code QP53AX15

Titulaire de l'autorisation

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle

Mise à jour de l'information: Octobre 2014