

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Frontline® Spot-on Cani S ad us. vet., soluzione per spot-on

Frontline® Spot-on Cani M ad us. vet., soluzione per spot-on

Frontline® Spot-on Cani L ad us. vet., soluzione per spot-on

Frontline® Spot-on Cani XL ad us. vet., soluzione per spot-on

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Basilea

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Boehringer Ingelheim Animal Health France, 4, ch. du Calquet, F-31000 Toulouse

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Frontline Spot-on Cani S ad us. vet., soluzione per spot-on

Frontline Spot-on Cani M ad us. vet., soluzione per spot-on

Frontline Spot-on Cani L ad us. vet., soluzione per spot-on

Frontline Spot-on Cani L ad us. vet., soluzione per spot-on

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

Principio attivo:

1 pipetta Frontline Spot-on Cani S da 0,67 ml di soluzione contiene 67 mg di fipronil.

1 pipetta Frontline Spot-on Cani M da 1,34 ml di soluzione contiene 134 mg di fipronil.

1 pipetta Frontline Spot-on Cani L da 2,68 ml di soluzione contiene 268 mg di fipronil.

1 pipetta Frontline Spot-on Cani XL da 4,02 ml di soluzione contiene 402 mg di fipronil.

Eccipiente:

Butilidrossianisolo (E320) 0,02%

Butilidrossitoluene (E321) 0,01%

Soluzione per spot-on.

Soluzione trasparente, da incolore a giallo-marrone.

4 INDICAZIONE(I)

Soluzione insetticida e acaricida per cani.

Per il trattamento dei cani:

- trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci e zecche; La protezione da nuove infestazioni dura 2 mesi per le pulci e 1 mese per le zecche.
- eliminazione dei pidocchi
- come parte di un trattamento dell'allergia alle punture di pulce (dermatite allergica da pulci, DAP).

5 CONTROINDICAZIONI

Non usare in animali malati o convalescenti.

Non usare nei conigli, poiché potrebbero manifestarsi reazioni avverse potenzialmente mortali.

La dimensione della pipetta è stata sviluppata appositamente per i cani. Non usare nei gatti, poiché potrebbe causare sovradosaggi.

Non trattare i cuccioli di età inferiore alle 8 settimane e/o di peso inferiore a 2 kg.

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

6 EFFETTI COLLATERALI

Qualora gli animali si leccino, si può osservare una transitoria salivazione dovuta principalmente agli eccipienti del prodotto.

Tra i casi estremamente rari di sospette reazioni avverse, sono state descritte reazioni cutanee transitorie nel sito di applicazione (decolorazione della cute, alopecia locale, prurito, eritema), nonché prurito diffuso o alopecia. In casi eccezionali sono stati osservati ipersalivazione, sintomi neurologici reversibili (ipersensibilità, depressione, sintomi nervosi), vomito e sintomatologia respiratoria.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Uso cutaneo esterno.

- 1 pipetta da 0,67 ml per un cane da 2 a 10 kg,
- 1 pipetta da 1,34 ml per un cane da 10 a 20 kg,
- 1 pipetta da 2,68 ml per un cane da 20 a 40 kg,
- 1 pipetta da 4,02 ml per un cane da 40 a 60 kg.

Per cani di peso superiore a 60 kg:

- 1 pipetta da 4,02 ml e 1 pipetta del dosaggio inferiore più appropriato.

In assenza di dati di innocuità, l'intervallo minimo fra due trattamenti non deve essere minore di 4 settimane.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Tenere la pipetta in posizione verticale. Picchiettare delicatamente in modo che il liquido si raccolga completamente nel corpo della pipetta. Spezzare la punta della pipetta nella posizione apposita.

Con le dita, muovere il pelo tra le scapole dell'animale fino a rendere visibile la cute. Posizionare la punta della pipetta sulla cute e svuotare completamente il contenuto in un punto della cute, premendo più volte. Il prodotto viene applicato tra le scapole per evitare che il cane lo leccchi.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Tempo di attesa: Non pertinente.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Conservare in un luogo asciutto.

Conservare nel contenitore originale.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione: Evitare il contatto con gli occhi dell'animale.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

È importante che il prodotto veterinario sia applicato in una zona in cui l'animale non riesca a leccarsi, e fare attenzione affinché gli animali trattati non si leccino l'uno l'altro dopo il trattamento.

Si consiglia di evitare immersioni in acqua o bagni nei 2 giorni successivi l'applicazione del prodotto e bagni con una frequenza superiore ad una volta alla settimana.

Si possono utilizzare shampoo emollienti prima del trattamento, ma, se utilizzati settimanalmente dopo l'applicazione del prodotto, riducono la durata della protezione nei confronti delle pulci a circa 5

settimane. Bagni settimanali con shampoo medicati al 2% di clorexidina non hanno ridotto l'efficacia del prodotto nei confronti delle pulci nel corso di uno studio della durata di 6 settimane.

Talvolta, anche negli animali trattati sussiste il rischio di aspirazione di zecche. Pertanto, in condizioni sfavorevoli, non si può escludere del tutto una trasmissione di malattie infettive.

Le pulci presenti sugli animali domestici spesso infestano la cuccia o cesta, le coperte e le zone in cui l'animale riposa, ad esempio tappeti, tende e tessuti d'arredamento; questi, in caso di infestazioni massive e all'inizio del trattamento antiparassitario, possono essere trattati con il prodotto. con un insetticida apposito e regolarmente ripuliti con un aspiratore.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Il prodotto può provocare irritazione alle mucose e agli occhi. Si consiglia quindi di evitare il contatto con la bocca e con gli occhi.

Evitare che il contenuto entri in contatto con le dita. In tal caso, lavarsi le mani con acqua e sapone.

In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Lavarsi le mani dopo l'utilizzo.

Non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a che il sito di applicazione non sia asciutto. Si consiglia quindi di non trattare gli animali durante il giorno, ma di trattarli alla sera e, se appena trattati, di non farli dormire con i proprietari, in particolare con i bambini. Evitare di fumare, mangiare o bere durante l'applicazione.

Le persone con nota ipersensibilità agli insetticidi o all'alcol devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Gravidanza e allattamento:

Frontline Spot-on Cani può essere utilizzato durante la gestazione o nel periodo dell'allattamento.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione: Nessuna conosciuta.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti): Evitare sovradosaggi. In caso di sovradosaggio, il rischio di intolleranze può aumentare, perciò è importante trattare sempre gli animali con la pipetta della dimensione adatta al loro peso.

Incompatibilità: Non note.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

Il fipronil può essere dannoso per gli organismi acquatici. Non contaminare stagni, corsi d'acqua o canali con il prodotto o con i contenitori vuoti.

Si consiglia di non permettere ai cani di nuotare in corsi d'acqua nei 2 giorni successivi all'applicazione del prodotto.

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

04.08.2021

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni:

S: Confezione da 3 pipette (1 blister con 3 pipette), ciascuna con 0,67 ml di soluzione per spot-on

M: Confezione da 3 pipette (1 blister con 3 pipette), ciascuna con 1,34 ml di soluzione per spot-on

L: Confezione da 3 pipette (1 blister con 3 pipette), ciascuna con 2,68 ml di soluzione per spot-on

XL: Confezione da 3 pipette (1 blister con 3 pipette), ciascuna con 4,02 ml di soluzione per spot-on

Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica
Swissmedic 53840

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.