

CANIQUANTEL PLUS M ad us. vet.

Comprimés sécables pour chiens Praziquantelum, Fenbendazolum

fr Notice d'emballage

Information destinée aux détenteurs d'animaux

Information professionnelle destinée au personnel médical, voir www.tierarzneimittel.ch

1. Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berne

Fabricant responsable de la libération des lots :

LOXAVET pharma GmbH, Max-Planck-Str. 11, 85716 Unterschleissheim, Allemagne

2. Dénomination du médicament vétérinaire

Caniquantel PLUS M ad us. vet., comprimés sécables pour chiens

3. Substances actives et autres composants

1 comprimé contient :

Substances actives :

Praziquantel 100 mg

Fenbendazole 1000 mg

Comprimés allongés roses avec sillon de sécabilité

4. Indications

Traitement des infections endoparasitaires mixtes chez les chiens, notamment :

Ascarides : *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*

Ankylostomes : *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*

Trichures : *Trichuris vulpis*

Cestodes : *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Multiceps multiceps*

Protozoaires : *Giardia* spp.

Il est également recommandé de baigner les chiens atteints d'une infection à *Giardia* car les kystes du parasite se retrouvent souvent dans leur pelage.

5. Contre-indications

Ne pas administrer Caniquantel PLUS M chez les chiennes en début de gestation.

6. Effets indésirables

Aucun connu

Si vous constatez des effets secondaires ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. Espèces cibles

Chien

8. Posologie pour chaque espèce, voies et mode d'administration

La dose thérapeutique est de 5 mg de praziquantel et de 50 mg de fenbendazole par kg de poids corporel. Un comprimé de Caniquantel PLUS M ad us. vet. correspond à une dose unitaire pour 20 kg de poids corporel. Le traitement contre les nématodes et les cestodes exige l'administration d'une dose de Caniquantel PLUS M ad us. vet. pendant deux jours consécutifs. L'infection à cestodes survenant chez le chiot nouveau-né au plus tôt après la troisième semaine de vie, le traitement avec Caniquantel PLUS M ad us. vet. n'est indiqué que lorsque le sujet a dépassé l'âge de 3 semaines. Le traitement contre les *Giardia* spp. exige l'administration d'une dose de Caniquantel PLUS M ad us. vet. pendant trois jours consécutifs. Il est recommandé de répéter le traitement après deux semaines.

9. Conseils pour une administration correcte

Les comprimés peuvent être administrés directement par voie orale ou incorporés entiers ou fragmentés dans la nourriture.

10. Temps d'attente

Sans objet

11. Conditions particulières de conservation

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15 – 25 °C).

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention «EXP.» sur le contenant.

12. Mises en garde particulières

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal

Une infection par un cestode du genre *Echinococcus* chez l'animal représente un danger pour l'être humain. En tant qu'épizootie à surveiller, elle est soumise à déclaration obligatoire en Suisse.

Comme les comprimés Caniquantel PLUS sont aromatisés, il existe un risque que les chiens et les chats les recherchent activement et qu'ils les ingèrent en quantité excessive. Les comprimés doivent donc être tenus hors de portée des animaux.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux

Il convient d'éviter tout contact direct avec la peau, les muqueuses et les yeux. En cas de contact avec la peau, les muqueuses et les yeux, laver abondamment avec de l'eau.

Gestation

Ne pas administrer Caniquantel PLUS M chez les chiennes en début de gestation.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes)

Le fenbendazole à haute dose, dépassant de plus de trois fois la dose recommandée, altère la fertilité.

13. Précautions particulières pour l'élimination des médicaments vétérinaires non utilisés ou des déchets dérivés de ces médicaments, le cas échéant

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. Date de la dernière notice approuvée

31.08.2021

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15. Informations supplémentaires

Carton avec plaquette thermoformée de 24 comprimés

Catégorie de remise B : remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 54'195

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.