

# CANIQUANTEL PLUS M ad us. vet.

## Comprese divisibili per cani Praziquantelum, Fenbendazolum

**it** Foglietto illustrativo

### Informazione per i detentori di animali

Informazione professionale per il personale medico vedi [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### 1. Nome e indirizzo del titolare dell'omologazione e, se diverso, del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti

Titolare dell'omologazione:

Dr. E. Graeb AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berna

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

LOXAVET pharma GmbH, Max-Planck-Str. 11, 85716 Unterschleissheim, Germania

### 2. Denominazione del medicamento veterinario

Caniquantel PLUS M ad us. vet., compresse divisibili per cani

### 3. Principi attivi ed altri ingredienti

Una compressa contiene:

Principi attivi:

Praziquantel 100 mg

Fenbendazolo 1000 mg

Comprese di colore rosa, di forma allungata, con una linea di incisione

### 4. Indicazioni

Per il trattamento di infezioni miste endoparassitarie in cani causate da:

Ascaridi: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*

Anchilostomi: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*

Trichiuridi: *Trichuris vulpis*

Cestodi: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Multiceps multiceps*

Protozoi: *Giardia* spp.

Si raccomanda di fare un bagno supplementare ai cani in caso di infezioni da *Giardia*, in quanto le cisti di questi parassiti sono spesso presenti nel pelo.

### 5. Controindicazioni

In una fase iniziale della gestazione, le cagne devono essere escluse dal trattamento con Caniquantel PLUS M.

### 6. Reazioni avverse

Non noti

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario.

### 7. Specie di destinazione

Cane

### 8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

La dose terapeutica è di 5 mg di praziquantel e 50 mg di fenbendazolo per kg di peso corporeo. Una compressa di Caniquantel PLUS M ad us. vet. corrisponde a una dose singola per 20 kg di peso corporeo.

Il trattamento contro nematodi e cestodi richiede la somministrazione di compresse di Caniquantel PLUS M ad us. vet. per due giorni consecutivi. Poiché nel cane neonato un'infezione da cestodi si verifica al più presto dopo la terza settimana di vita, il trattamento con Caniquantel PLUS M ad us. vet. è indicato solo dopo la terza settimana di vita.

Il trattamento contro la *Giardia* spp. nei cani richiede la somministrazione di compresse di Caniquantel PLUS M ad us. vet. per tre giorni consecutivi. Si raccomanda di ripetere la terapia dopo due settimane.

### 9. Avvertenze per una corretta somministrazione

Le compresse vengono somministrate direttamente, avvolte o schiacciate insieme al cibo.

### 10. Tempi di attesa

Non pertinente

### 11. Particolari precauzioni per la conservazione

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C).

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata con «EXP.» sul contenitore.

### 12. Avvertenze speciali

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Un'infezione da cestodi del genere *Echinococcus* negli animali rappresenta un pericolo per l'uomo. Trattandosi di una malattia animale soggetta a sorveglianza, in Svizzera deve essere segnalata.

Poiché le compresse di Caniquantel PLUS sono aromatizzate, esiste il rischio che cani e gatti le cerchino spontaneamente e ne assumano un dosaggio eccessivo. Per questo motivo, la preparazione deve essere conservata fuori dalla portata degli animali.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Evitare il contatto diretto con la pelle, le mucose e gli occhi. In caso di contatto con la pelle, le mucose e gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua.

Gravidanza

In una fase iniziale della gestazione, le cagne devono essere escluse dal trattamento con Caniquantel PLUS M.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)

In dosi elevate che superano la dose raccomandata di più di tre volte, il fenbendazolo compromette la fertilità.

### 13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

### 14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

31.08.2021

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### 15. Altre informazioni

Astuccio di cartone con blister da 24 compresse

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria  
Swissmedic 54'195

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.