

INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Capstar 11,4 mg ad us. vet., compresse per cani e gatti

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Elanco Tiergesundheit AG
Mattenstrasse 24A
4058 Basilea

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Francia

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Capstar 11,4 mg ad us. vet., compresse per cani e gatti

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

Una compressa contiene:

Principio attivo:

Nitenpyram 11,4 mg

Compresse di colore da bianco a leggermente giallastro, rotonde, biconvesse, con bordi smussati, con impresso «RB» su un lato e «CG» sull'altro.

4 INDICAZIONE(I)

Trattamento delle infestazioni da pulci in gatti e cani.

5 CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in animali di peso corporeo inferiore a 1 kg.

Non utilizzare Capstar in animali di età inferiore a 4 settimane, poiché non sono disponibili dati a riguardo.

6 EFFETTI COLLATERALI

Nella prima ora dopo la somministrazione di Capstar, quando il prodotto inizia ad agire, l'animale domestico può talvolta avvertire un prurito più intenso causato dall'aumentata attività delle pulci. L'effetto è transitorio e si risolve rapidamente quando le pulci si indeboliscono e muoiono.

In casi molto rari sono stati riportati sintomi transitori del sistema nervoso, quali tremori muscolari, disturbi del movimento e convulsioni.

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati mostra effetti collaterali durante il trattamento)
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10 000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglio illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani, gatti.

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per uso orale. La dose minima di Capstar è di 1 mg/kg di peso corporeo.

Somministrare il medicamento veterinario secondo la seguente tabella:

Peso corporeo del cane (kg)	Numero di compresse di Capstar 11,4 mg da somministrare
1 – 11	1
> 11 – 22	2
> 22 – 33	3
> 33 – 44	4
> 44 – 55	5
> 55 – 66	6

La frequenza del trattamento dipende dall'entità dell'infestazione. In caso di infestazione da pulci grave, può essere necessario trattare gli animali tutti i giorni o a giorni alterni finché l'infestazione da

pulci è sotto controllo. Il trattamento può essere ripreso se le pulci ricompaiono. Non somministrare più di una volta al giorno.

Capstar non ha un effetto a lungo termine. Per prevenire la reinfestazione è raccomandato un appropriato trattamento di controllo degli stadi immaturi del ciclo biologico della pulce.

Per un controllo ottimale delle pulci in un ambiente domestico con diversi animali, si devono trattare contemporaneamente tutti i cani e i gatti (vedere anche la rubrica 12. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali).

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Capstar compresse può essere somministrato con o senza cibo. Per facilitare la somministrazione, le compresse possono essere nascoste in una piccola quantità di cibo.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Non usare più questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola e sul blister con la dicitura EXP. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

In caso di infestazioni da pulci particolarmente ostinate e qualora il cane o il gatto in questione abbia contratto la tenia dalle pulci, si dovrà consultare uno specialista per concordare un programma di trattamento appropriato.

Le pulci possono infestare cucce, coperte e luoghi di riposo abituali di cani e gatti, come ad es. tappeti e mobili imbottiti, in tutti gli stadi di sviluppo. Nel caso di una massiccia infestazione da pulci e nella fase iniziale delle misure di controllo, le aree in questione devono essere trattate con un prodotto idoneo per il trattamento ambientale e quindi pulite periodicamente con un aspirapolvere. I cuscini e le coperte devono essere lavati idealmente ad almeno 60° C.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Nessuna.

Gravidanza e allattamento:

Può essere somministrato durante la gravidanza e l'allattamento.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

Non sono stati osservati effetti collaterali quando Capstar è stato somministrato insieme ad altre sostanze comunemente impiegate nella medicina veterinaria (inclusi antipulci, vaccini o antibiotici).

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Il principio attivo di Capstar è ben tollerato dalle specie di destinazione. Sovradosaggi fino a 50 mg/kg nei gatti (più del sovradosaggio quadruplo) e fino a 70 mg/kg nei cani (più del sovradosaggio sestuplo) sono risultati asintomatici.

Solo a posologie più elevate si osservano effetti collaterali quali salivazione, vomito, feci molli, convulsioni o attività ridotta e la loro gravità aumenta all'aumentare della dose. I sintomi scompaiono rapidamente e il recupero è completo entro 24 ore dopo la somministrazione del sovradosaggio, grazie alla rapida eliminazione del principio attivo di Capstar. Durante 6 mesi di somministrazione giornaliera nel gatto e nel cane non sono stati osservati effetti collaterali significativi correlati al trattamento.

Incompatibilità:

Non pertinente.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/a veterinaria/ veterinario o alla/al propria/o farmacia come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

18.03.2024

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Gli effetti di Capstar sulle pulci cominciano già 15 - 30 minuti dopo la somministrazione all'animale ospite. Gli studi hanno dimostrato un'efficacia del 95 - 100% nel rimuovere le pulci entro le prime 6 ore. Nel corso di 24 ore, l'efficacia contro le pulci presenti sull'animale raggiunge il 100%.

Scatola pieghevole contenente 1 blister da 6 compresse ciascuno.

Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica

Swissmedic 55168

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.