

Informazione professionale sul medicamento

Bisolvon® ad us. vet.

Broncosecretolitico

Polvere per bovini, vitelli, maiali, cani e gatti

Composizione

Bromexina cloridrato 10 mg.

Excipients ad pulverem pro 1 g.

1 misurino contiene circa 5 g di polvere.

Proprietà / Effetti

Il Bisolvon, col principio attivo bromexina, fluidifica il muco bronchiale viscoso e ristagnante nelle vie respiratorie.

Calma la molesta tosse irritativa.

Il tempo occorrente per la guarigione dipende dal grado della malattia. La durata della terapia va stabilita di conseguenza. In caso di affezione acuta delle vie respiratorie è sufficiente somministrare da 2 a 3 dosi giornaliere, evtl. continuando per alcuni giorni. Se la malattia è passata allo stadio cronico è necessaria una terapia di durata da una a parecchie settimane.

Naturalmente, in presenza di alterazioni polmonari irreparabili non ci si può aspettare un successo terapeutico radicale. Nelle affezioni delle vie respiratorie di origine batterica la somministrazione concomitante di antibiotici e Bisolvon ha influito in modo convincente sul decorso della malattia. La guarigione è stata nettamente più rapida che con la terapia con soli antibiotici.

Farmacocinetica

Nel maiale, i tassi sanguigni massimi si ottengono da 2 a 3 ore dopo la somministrazione orale di 0,25 mg di

bromexina cloridrato per kg di peso corporeo. Un equilibrio tra assorbimento ed eliminazione è stato raggiunto con un intervallo tra le dosi di 12 ore dopo la seconda somministrazione. Nel vitello, con uno schema posologico identico la concentrazione sanguigna aumenta in modo continuo per 5 giorni. In questo intervallo di tempo non si raggiunge un equilibrio.

Indicazioni

Bovino: bronchite acuta e cronica, polmonite acuta, sequele di un'elmintiasi polmonare.

Manifestazioni infiammatorie e ostacolo meccanico alla respirazione dopo aspirazione del liquido amniotico nel vitello. Influenza dei vitelli, influenza del commercio (che spesso non si riesce a risolvere con i soli antibiotici).

Maiale: polmonite acuta e cronica, influenza dei lattinzoli.

Cane: polmonite acuta e cronica, tosse secca molesta, cimurro (malattia virale dei cani).

Gatto: polmonite acuta e cronica.

Nei casi febbrili acuti associato alla somministrazione di antibiotici e/o sulfamidici.

Posologia / Modo d'uso

La polvere è destinata alla continuazione della terapia iniziata con iniezioni. È di sapore particolarmente gradevole e gli animali la prendono senza difficoltà se la si cosparge su una piccola quantità di cibo concentrato previamente umettato, la si scioglie nel beveraggio o la si somministra direttamente.

Bovino	2 - 3 misurini al giorno
Vitello	½ - 1 misurino al giorno
Maiale	½ - 1 misurino al giorno
Lattinzoli, per figliata	1 misurino al giorno

Cane 0,5 - 2,0 g al giorno

Gatto 0,25 - 0,5 g al giorno

Per il trattamento a gruppi dei maiali e dei vitelli, al manifestarsi dei primi sintomi di tosse si somministra a tutti gli animali 1 g di polvere Bisolvon / 25 kg di peso corporeo al giorno per 7 giorni. Per i maiali cospargere la polvere sul cibo previamente umettato. Per i vitelli incorporare la polvere Bisolvon nel beveraggio. Il misurino contiene circa 5 g di polvere Bisolvon.

Limitazioni d'uso

Controindicazioni

Non usare in caso di edema polmonare (accumulo di liquido nei polmoni).

Precauzioni

Nessuna.

Effetti indesiderati

Non se ne conoscono.

Termini d'attesa

Tessuti commestibili del maiale: 0 giorni

Tessuti commestibili del bovino: 3 giorni

Non usare per animali il cui latte è destinato al consumo.

Interazioni

La bromexina cloridrato modifica la permeabilità delle mucose delle vie respiratorie e dei vasi sanguigni, ciò che in caso di somministrazione concomitante può causare un aumento della concentrazione di certi antibiotici e sulfamidici nelle mucose bronchiali.

Altre avvertenze*Stabilità*

Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente (15 – 25 °C).

il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Confezioni

1 kg

Swissmedic 55'690 (D)

Codice ATCvet QR05CB02

Titolare dell'omologazione

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, 4002 Basilea

Stato dell'informazione

Giugno 2006