1. Denominazione del medicamento veterinario
Incontex® ad us. vet., sciroppo per cani

2. Composizione qualitativa e quantitativa
1 ml contiene:
Principio attivo:

Fenilpropanolamina cloridrato	25.00 mg
(equivalente a fenilpropanolamina	20.14 mg)

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. Forma farmaceutica
Sciroppo
Soluzione chiara di colore marrone-rossastro

4. Informazioni cliniche

4.1. Specie di destinazione
Cane

4.2. Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione
Per il trattamento dell'incontinenza urinaria nei cani causata da una chiusura inadeguata dell'orifizio vescicale

4.3. Controindicazioni
Incontex non deve essere usato in animali con aritmia cardiaca, ipertensione, problemi renali o glaucoma.
Non somministrare ad animali in gravidanza o in allattamento.
Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

4.4. Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione
Incontex non è adatto al trattamento dell'orinazione inappropriata causata da un disturbo comportamentale.
Nelle cagne sotto l'anno di età, prima del trattamento è opportuno considerare la possibilità di una malformazione anatomica come causa dell'incontinenza urinaria.

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego
Precauzioni speciali per l'impiego negli animali
A causa degli effetti simpaticomimetici cardiovascolari, il paziente deve essere esaminato periodicamente per eventuali effetti collaterali. Il proprietario deve essere adeguatamente istruito sul dosaggio del prodotto.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali
In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.
Un sovradosaggio elevato è potenzialmente letale, soprattutto nei bambini.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con il prodotto, lavare accuratamente con acqua e sapone. Lavarsi le mani dopo l'uso.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita per almeno 15 minuti.

4.6. Reazioni avverse (frequenza e gravità)
Possono verificarsi ipereccitabilità, ansia, letargia, anoressia, diarrea, vomito, aritmia cardiaca e debolezza circolatoria.
In alcuni casi, è stato osservato un lieve grado di arruffamento dei peli sulla nuca.

4.7. Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione
Non somministrare ad animali in gravidanza o in allattamento.

4.8. Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione
Durante il trattamento con Incontex non deve essere somministrato nessun altro medicamento simpaticomimetico.

4.9. Posologia e via di somministrazione
1.5 mg di fenilpropanolamina cloridrato per kg di peso corporeo due volte al giorno da somministrare insieme al cibo.

La pompetta dosatrice in dotazione è calibrata come segue:

Peso corporeo (kg)	Quantità di Incontex (ml)	Peso corporeo (kg)	Quantità di Incontex (ml)
8	0.5	48	3
16	1	56	3.5
24	1.5	64	4
32	2	72	4.5
40	2.5	80	5

Per l'uso, staccare la pompetta dosatrice insieme al tappo a vite dal coperchio di protezione e avvitarla sul flacone. Tirando lo stantuffo, estrarre la quantità necessaria di Incontex e mescolarla al cibo.

4.10. Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Per questo medicinale veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

4.11. Tempi di attesa

Non pertinente

5. Proprietà farmacologiche

Gruppo farmacoterapeutico: Simpaticomimetici, altri farmaci urologici, fenilpropanolamina
Codice ATCvet: QG04BX91

5.1. Proprietà farmacodinamiche

L'agonista α-adrenergico fenilpropanolamina ha effetti simpaticomimetici sia diretti sia indiretti: direttamente tramite legame ai recettori α_1-adrenergici, indirettamente mediante rilascio e inibizione della ricaptazione della noradrenalina dal vallo sinaptico. La fenilpropanolamina causa costrizione della muscolatura liscia in vari tessuti. Questo porta, tra l'altro, a un aumento della pressione di chiusura uretrale sulla vescica urinaria, una proprietà che può essere utilizzata per trattare l'incontinenza urinaria. All'inizio della terapia, l'effetto α-adrenergico può causare tachicardia e un aumento della pressione arteriosa; successivamente, tuttavia, tende a verificarsi l'effetto opposto a causa dell'esaurimento delle riserve di noradrenalina (tachifilassi).

5.2. Informazioni farmacocinetiche

Quando somministrata per via orale, la fenilpropanolamina viene quasi completamente assorbita. I livelli plasmatici terapeuticamente efficaci sono raggiunti entro due ore e possono essere mantenuti per tutto il giorno con una somministrazione doppia. L'escrezione avviene per la maggior parte invariata nelle urine.

5.3. Proprietà ambientali

Nessuna informazione

6. Informazioni farmaceutiche

6.1. Elenco degli eccipienti

Saccarina sodica
Saccarosio
Glicole propilenico
Caramello (E150)
Glicerolo 85%
Acido citrico monoidrato (E330)
Sciroppo di glucosio
Estratto d'aglio
Acqua depurata

6.2. Incompatibilità principali

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

6.3. Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi
Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi

6.4. Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C). Proteggere dalla luce.

6.5. Natura e composizione del confezionamento primario

Flacone di vetro di color ambra da 150 ml con pompetta dosatrice in scatola

6.6. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicamento veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7. Titolare dell'omologazione all'immissione in commercio

Dr. E. Graeub AG
Rehhagstrasse 83
3018 Berna
Tel.: 031 980 27 27
Fax: 031 980 27 28
info@graeub.com

8. Numeri dell'omologazione all'immissione in commercio

Swissmedic 55'854'001 150 ml flacone
Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

9. Data della prima omologazione/rinnovo dell'omologazione

Data della prima omologazione: 02.05.2001
Data dell'ultimo rinnovo: 12.07.2021

10. Data di revisione del testo

28.12.2021

Divieto di vendita, fornitura e/o impiego

Non pertinente