

DOXYCAT® 20

ad. us. vet., Tabletten
Antibiotikum für Katzen

ZUSAMMENSETZUNG

Doxycyclinum (ut Doxycyclini hyclas) 20 mg, Aromatica, Excipients pro Compresso.

EIGENSCHAFTEN/WIRKUNGEN

Doxycyclin ist ein halbsynthetisches Antibiotikum mit breitem Wirkungsspektrum aus der Familie der Tetrazykline. Es wirkt gegen Gram positive und Gram negative, aerobe und anaerobe Mikroorganismen sowie gegen Mykoplasmen. Doxycyclin ist besonders wirksam gegen Staphylokokken und Pasteurellen. Doxycyclin hemmt die bakterielle Proteinsynthese.

PHARMAKOKINETIK

Doxycyclin wird auf dem oralen Weg gut resorbiert. Die systemische Bioverfügbarkeit (90-100%) wird durch die Nahrungsaufnahme wenig beeinflusst. Doxycyclin penetriert gut in die Gewebe und erreicht, im Gegensatz zu den anderen Tetrazyklinen, auch das Hirngewebe. Die Ausscheidung erfolgt hauptsächlich fäkal, in geringerem Ausmass renal. Die Halbwertszeit der Ausscheidung beträgt ungefähr 12 Stunden. Hervorzuheben ist, dass Doxycyclin nicht in den Nieren angereichert wird; es kann somit auch bei Niereninsuffizienz ohne besondere Anpassung der Dosierung angewandt werden.

INDIKATIONEN

Infektionen verursacht durch Doxycyclin-empfindliche Keime bei der Katze: Infektionen des Atmungsapparates.

DOSIERUNG/ANWENDUNG

Peroral. 10 mg Doxycyclin pro kg Körpergewicht einmal pro Tag während 3 bis 5 Tagen in akuten Fällen und während 8 bis 10 Tagen in chronischen Fällen, d.h. 1 Tablette DoxyCat® 20 pro 2 kg Körpergewicht pro Tag.

ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

Kontraindikationen: Keine.

Vorsichtsmassnahmen: DoxyCat® 20 sollte während der Fütterung eingenommen werden, um ein Erbrechen zu verhindern. Da das Tierarzneimittel aromatisiert ist, besteht die Gefahr, dass Hunde und Katzen die Tabletten gezielt aufsuchen und übermässig aufnehmen. Aus diesem Grund ist das Präparat für Tiere unerreichbar aufzubewahren.

UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Eine längere Verabreichung von Tetracyclinen während des Zahnwachstums kann eine gelbliche Verfärbung der Zähne zur Folge haben. Wegen der schwachen Affinität des Doxycyclin zu Calcium ist dieses Risiko bei DoxyCat® 20 geringer als bei anderen Tetracyclinen.

SONSTIGE HINWEISE

DoxyCat® 20 wird während der Trächtigkeit oder der Laktation gut vertragen. Lagerung bei Raumtemperatur (15 – 25 °C). Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «Exp.» bezeichneten Datum verwendet werden.

PACKUNG

Packung zu 2 x 12 Tabletten.

Packung zu 10 x 12 Tabletten.

Swissmedic 56'112 (A)
ATCvet QJ01AA02

Stand der Information
März 2016.

Zulassungsinhaberin
Biokema SA
Crissier-Lausanne