

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

DoxyCat® 20 ad us. vet., comprimés sécables pour chats.

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Biokema SA, Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier.

Fabricant responsable de la libération des lots : Ceva Santé Animale, Zone autoroutière, 53950 Louverné, France.

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

DoxyCat® 20 ad us. vet., comprimés sécables pour chats.

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient :

Substance active :

Doxycycline (sous forme hyclate de doxycycline) 20 mg

Comprimé beige à jaune-beige avec une ligne de sécabilité.

4 INDICATION(S)

Antibiotique pour chats.

Affections causées par des germes sensibles à la doxycycline chez le chat : infections respiratoires.

5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à un autre composant.

Ne pas utiliser en cas de troubles de la déglutition ou de pathologies accompagnées de vomissements.

Ne pas utiliser chez des animaux présentant une sensibilité connue à la lumière.

Ne pas utiliser chez des animaux atteints de défaillance du foie.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Une administration prolongée d'une substance active de la classe des tétracyclines (telle que celle contenue dans DoxyCat® 20) pendant la croissance des dents peut entraîner une coloration jaune

des dents. Ce risque est plus faible pour la substance active de DoxyCat® 20 que pour les autres tétracyclines.

Après contact avec une lumière ultra-violette intense, des réactions de photosensibilité ont été observées lors d'un traitement par les tétracyclines.

Des vomissements, une œsophagite et des diarrhées ont été rapportées après un traitement avec de la tétracycline. Le médicament ne doit donc pas être administré à des patients qui présentent une dysphagie ou des troubles accompagnés de vomissements.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chats.

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Par voie orale.

10 mg de doxycycline par kg de poids corporel une fois par jour pendant 3 à 5 jours pour les cas à évolution rapide (aigus) et pendant 8 à 10 jours dans pour les cas à évolution lente (chroniques), soit 1 comprimé de DoxyCat® 20 par 2 kg de poids corporel par jour.

Poids corporel	Comprimés
1 kg	½
2 kg	1
3 kg	1 ½
4 kg	2
5 kg	2 ½
6 kg	3

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Les comprimés doivent être administrés avec la nourriture (voir rubrique 12).

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15°C – 25°C).

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte

La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal : DoxyCat® doit être pris pendant l'alimentation afin de réduire la probabilité de vomissements et l'apparition d'une inflammation de l'œsophage.

Comme les comprimés sont aromatisés, il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent de manière ciblée et les absorbent en quantité excessive. Pour cette raison, le médicament vétérinaire doit être conservé hors de portée des animaux. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux.

L'utilisation de médicaments vétérinaires doit être basée sur l'identification et l'évaluation de la sensibilité du pathogène ciblé. Si ceci est impossible, le traitement doit se baser sur des informations épidémiologiques et de sensibilité de l'agent pathogène ciblé au plan local/régional. Une utilisation du médicament vétérinaire différente de celle indiquée dans l'information professionnelle peut augmenter la fréquence des bactéries résistantes à la substance active du DoxyCat® et réduire l'efficacité d'un traitement avec d'autres substances actives de la même classe (tétracyclines). Il convient de prendre en compte les politiques officielles, nationales et régionales concernant l'antibiothérapie lors de l'utilisation du produit.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux : Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux tétracyclines doivent éviter le contact avec le médicament vétérinaire. Se laver les mains après utilisation. Si des symptômes surviennent après le contact avec le médicament vétérinaire, consulter immédiatement un médecin et lui montrer la notice ou l'étiquette.

Gestation et lactation : DoxyCat® 20 est bien toléré dans les conditions de gestation ou de lactation.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions : Ne pas administrer en combinaison avec certains autres antibiotiques.

Certains médicaments (par ex. les préparations à base de fer ou certains médicaments pour le traitement de l'épilepsie ou la neutralisation du suc gastrique) peuvent, en cas d'administration simultanée, modifier les propriétés de la substance active contenue dans le DoxyCat® 20. Demandez conseil à votre vétérinaire.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) : Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles devront faire l'objet d'un traitement symptomatique.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

08.02.2024

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Boîte de 2 ou 10 blisters contenant chacun 12 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 56'112

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.