

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Zitac[®] vet 100 ad us. vet., comprimés pour chiens

Zitac[®] vet 200 ad us. vet., comprimés pour chiens

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: MSD Animal Health SARL, Werftstrasse 4, 6005 Lucerne

Fabricant responsable de la libération des lots: Intervet GesmbH, Siemensstrasse 105, 1210 Vienne, AT

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Zitac[®] vet 100 ad us. vet., comprimés pour chiens

Zitac[®] vet 200 ad us. vet., comprimés pour chiens

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient:

Substance active:

Cimétidine

100 mg resp. 200 mg

Comprimé oblong avec barre de sécabilité sur les 2 faces, permettant de les couper en deux.

4. INDICATION(S)

Chez les chiens, Zitac[®] vet est indiqué:

- pour toutes les maladies qui nécessitent une réduction de la sécrétion d'acide gastrique, notamment pour réduire les vomissements dus à une inflammation chronique de la muqueuse gastrique, et
- pour la thérapie préventive et d'accompagnement en cas d'inflammation de la muqueuse gastrique causée par des problèmes rénaux et lors de l'administration d'analgésiques.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas administrer aux chiens présentant une hypersensibilité connue à la cimétidine.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Le gonflement temporaire des trayons (gynécomastie) chez les chiennes peut s'expliquer par l'effet inhibiteur de la cimétidine sur les hormones sexuelles mâles. Le gonflement disparaît sans traitement. Chez les rats et les chiens mâles, une diminution du poids de la prostate a été constatée, mais cela n'a aucun effet sur la fertilité, et cet effet est également transitoire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

5 - 10 mg de cimétidine par kg de poids vif (PV), 3 fois par jour per os, soit:

Poids vif	Nombre de comprimés Zitac [®] vet 100 mg	Nombre de comprimés Zitac [®] vet 200 mg
6 - 10 kg	½ - 1	
11 - 20 kg	1 - 2	½ - 1
21 - 40 kg		1 - 2
41 - 60 kg		1½ - 3

Zitac[®] vet devrait être administré à l'animal à jeun.

En général, le traitement avec Zitac[®] vet est rapidement suivi d'une diminution des troubles, sans éliminer la cause. Un résultat durable de la thérapie dépend de l'inflammation de la muqueuse gastrique si elle peut être soignée et dans quelle mesure. C'est pourquoi il peut être indiqué de poursuivre le traitement pendant plus d'un mois.

Des mesures diététiques d'accompagnement telles que le passage à une alimentation hypoallergénique sont à recommander.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Pour l'administration orale.

10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'emploi chez l'animal:

Chez les chiens souffrant d'insuffisance rénale, le dosage de Zitac® vet doit être réduite en fonction de la gravité du problème, car l'excrétion du principe actif peut être réduite.

Le traitement avec l'ingrédient actif cimétidine contenu dans Zitac® vet seul ne peut pas inverser les changements causaux associés à l'inflammation de la muqueuse gastrique, mais seulement atténuer les symptômes associés.

Les chiens qui vomissent continuellement devraient subir un examen approfondi afin de déterminer l'origine exacte de ces troubles. Ceci est particulièrement important chez les animaux âgés.

Gestation et lactation:

La cimétidine passe dans le lait. L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation et de lactation. Utiliser uniquement après consultation avec le vétérinaire traitant.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions:

La cimétidine interfère avec le métabolisme hépatique. Cela peut affecter l'élimination de certains médicaments. Si le chien doit recevoir d'autres médicaments vétérinaires en plus de Zitac® vet, cela doit être discuté à l'avance avec le vétérinaire traitant.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

Il a été prouvé que le médicament administré oralement à la dose de 75 mg de cimétidine/kg de poids vif par jour (cinq fois la dose recommandée) pendant une période de 91 jours, était bien toléré.

Des symptômes spécifiques en cas de surdosage ne sont pas connus.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

27.07.2022

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Présentations:

Zitac[®] vet 100: Emballage de 10 blisters à 10 comprimés avec une ligne de sécabilité
Zitac[®] vet 200: Emballage de 10 blisters à 10 comprimés avec une ligne de sécabilité
Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 56171

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.