

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Zitac[®] vet 100 ad us. vet., compresse per cani

Zitac[®] vet 200 ad us. vet., compresse per cani

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: MSD Animal Health Srl, Werftestrasse 4, 6005 Lucerna
Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Intervet GesmbH, Siemensstrasse 105, 1210 Vienna, AT

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Zitac[®] vet 100 ad us. vet., compresse per cani

Zitac[®] vet 200 ad us. vet., compresse per cani

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene:

Principio attivo:

Cimetidina 100 mg resp. 200 mg

Compresse oblunghe con linea di frattura su entrambi i lati, attestata per la divisione.

4. INDICAZIONE(I)

Nei cani, Zitac[®] vet è indicato:

- in tutte le malattie che richiedono una riduzione della secrezione degli acidi gastrici, soprattutto per ridurre il vomito causato da un'infiammazione cronica della mucosa gastrica, nonché
- nella terapia preventiva e di supporto in caso di infiammazione della mucosa gastrica causata da problemi renali e in caso di somministrazione di antidolorifici.

5. CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare nei cani con ipersensibilità nota alla cimetidina.

6. EFFETTI COLLATERALI

Il gonfiore temporaneo dei capezzoli (ginecomastia) nelle femmine può essere spiegato dall'effetto inibitorio che la cimetidina ha sugli ormoni sessuali maschili. Il gonfiore scompare senza trattamento. Nei ratti e nei cani maschi, si è osservata una riduzione del peso della prostata, che però non ha effetti sulla capacità riproduttiva; anche questo effetto è transitorio.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

5 - 10 mg di cimetidina per kg di peso corporeo (PC) 3 volte al giorno per os, equivalenti a:

Peso corporeo	Numero di compresse Zitac [®] vet 100 mg	Numero di compresse Zitac [®] vet 200 mg
6 - 10 kg	½ - 1	
11 - 20 kg	1 - 2	½ - 1
21 - 40 kg		1 - 2
41 - 60 kg		1½ - 3

Zitac[®] vet deve essere somministrato all'animale a stomaco vuoto.

Il trattamento con Zitac[®] vet porta in generale a una riduzione dei sintomi in breve tempo senza eliminare la causa. Un risultato duraturo del trattamento dipenderà dall'entità di guarigione dell'infiammazione della mucosa gastrica. Pertanto, può essere indicato la prosecuzione del trattamento per più di un mese.

Si raccomandano delle misure dietetiche concomitanti, quali la modifica dell'alimentazione con una dieta ipoallergenica.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Per somministrazione orale.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Nei cani con insufficienza renale, la posologia di Zitac[®] vet deve essere ridotta in base alla gravità del problema, perché l'eliminazione del principio attivo può essere ridotta.

Il trattamento con il principio attivo cimetidina contenuto in Zitac[®] vet da solo non può invertire i cambiamenti causali associati all'infiammazione della mucosa gastrica, ma solo alleviare i sintomi

associati. I cani che vomitano in continuazione devono essere sottoposti a esami approfonditi per diagnosticare la causa del vomito. Ciò è importante soprattutto negli animali anziani.

Gravidanza e allattamento:

La cimetidina passa nel latte materno. La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita. Utilizzare solo dopo aver consultato il veterinario curante.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

La cimetidina interferisce con il metabolismo epatico. Ciò può influire sull'eliminazione di alcuni medicinali. Se al cane devono essere somministrati altri medicinali veterinari oltre a Zitac[®] vet, questo dovrebbe essere discusso in anticipo con il veterinario curante.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

È stato dimostrato che i cani hanno tollerato bene la cimetidina formulata in questo medicinale veterinario quando è stata somministrata per via orale a 75 mg/kg di peso corporeo al giorno (5 volte la dose giornaliera raccomandata) per 91 giorni.

Non sono noti sintomi specifici di sovradosaggio.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

27.07.2022

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni:

Zitac[®] vet 100: Astuccio con 10 blister da 10 compresse con linea di frattura

Zitac[®] vet 200: Astuccio con 10 blister da 10 compresse con linea di frattura

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 56171

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.